

◆ Herpecia cream是含有抗病毒药acyclovir的口唇疱疹的复发治疗药。■如果出现火辣辣、刺痛等复发征兆，尽早开始治疗会更有效。

效能或效果

口唇疱疹的复发（仅限曾经接受过医生的诊断、治疗的人）

用法及用量

1天3~5次，请取适量涂抹于患处。
感觉到嘴唇及其周围部位火辣辣、刺痛等不适感，请马上涂抹
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
注意不要入眼。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗。症状严重时应前往眼科就诊。
仅限用于外用。
虽然放进嘴里也没有害处，但是请尽量不要放进嘴里或用嘴舔。

成分及分量

1 g 中
Aciclovir 50mg

添加剂

Glycerin,Dimethylpolysiloxane ,Stearyl alcohol ,Propylene glycol,Liquid paraffin,l-Menthol,Sorbitan stearate,Polysorbate 60 ,Butyl parahydroxybenzoate,citric acid,Sodium citrate

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
下述人群请不要使用。
被认为是初次发病的人群、患处范围较大的人群。（如果首次发病症状有可能会加重，患处范围较大为重症，请接受医生的治疗）
因为本药剂、本药剂的成分或valacyclovir药剂引起过过敏症状的人。（使用本药剂有可能会再次引起过敏症状）
未满6岁的婴幼儿。（如果是婴幼儿，可以认为初次感染的可能性较高）
请不要用于下述部位。
眼睛或眼睛的周围。（有可能进入眼睛引起刺激）
除嘴唇部及其周围的部位。（口唇疱疹出现在嘴唇及其周围）

咨询事项

下述人群在使用前，请咨询医生或药剂师。
正在接受医生治疗的人群。（可能会影响医生处方的药物或也有可能使用与本药剂相同的药物）
孕妇或有可能性的人群。（必须谨慎用药，向专业医生咨询意见并接受指示）
处于哺乳期的人群。（已确认相同成分的医疗用内服药会转移到乳汁中）
因药物等引起过过敏症状的人群。（因药物等引起过过敏症状的人，用本药剂也有可能过敏）
湿润或糜烂较为严重的人群。（症状较重时必须向专业医生咨询意见并接受指示）
有特应性皮炎的人群。（有可能使症状加重，必须向专业医生咨询意见并接受指示）
使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生或药剂师
皮肤：起疹发红、肿胀、发痒、斑疹、刺激感、疼痛、干燥、灼热感、落屑（头皮屑、头垢之类的皮肤脱落）、荨麻疹
（可以认为是因为本药剂引起的过敏症状、或本药剂的药理作用有较强表现，如果是这样的情况，继续使用相同药物有可能会进一步加重症状）
即使使用5天左右症状仍不见好转、或加重时，请停止使用并携带本说明书咨询医生或药剂师
（即使使用5天左右症状仍不见改善时，应该考虑症状较重或因其他疾病引起的，请尽快咨询医生或药剂师）

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
请保管在儿童无法触及的地方。
使用前请仔细洗手。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
请勿服用超过使用期限的产品。
此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内使用。（为了保证质量）

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任