

NEW SULFA GLYCYR IRIS

第二类医药品
眼药水

◆NEW SULFA GLYCYR IRIS眼药水中含有针对麦粒肿以及结膜炎的致病菌有显著抗菌效果的持续性抗菌剂sodium sulfamethoxazole和缓解眼睛的炎症和发痒症状的成分。

效能或效果

结膜炎（流行性角结膜炎）、针眼、眼睑炎（眼睑糜烂）、眼睛发痒

用法及用量

请按1天3~6次，1次2~3滴点眼。
请严格遵守规定的用法用量。
儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
请勿戴着软性隐形眼镜使用。
仅限作为滴眼药水使用。

成分及分量

Sodium Sulfamethoxazole 4.00%
Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25%
Chlorpheniramine Maleate 0.03%
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 0.10%

添加剂

Sodium borate,pH adjusting agent,Benzalkonium chloride,Edetate sodium,Polysorbate 80

成分及分量相关注意

用本药剂滴眼后，有时口中会感觉到苦味或甜味。苦味是有效成分sulfamethoxazole引起的，且甜味是有效成分dipotassium glycyrrhizinate引起的，因此不用担心。

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）
●不要长期连续服用

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
拥有以下症状的人群
眼睛剧烈疼痛
使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者
皮肤：
起疹、发红
发痒
眼睛：
充血
发痒
红肿
●若使用3~4天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。
请保管在儿童无法触及的地方。
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
请勿与其他人共用
请勿置于汽车的仪表板等高温下。（会发生容器变形或药液的质量劣化）
请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）
根据保存状态，成分的结晶可能会附着在容器的前端或盖子内侧。此时，请用干净的纱布等轻轻擦拭后使用。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任