

# NEW SULFA GLYCYR IRIS

第二類醫藥品  
眼藥水

◆NEW SULFA GLYCYR IRIS 為含對於引起麥粒腫、結膜炎的病菌發揮優異殺菌力的持久型抗菌劑sodium sulfamethoxazole以及舒緩眼睛發炎、發癢成分的眼藥水。

## 療效或效果

結膜炎（流行性結膜炎）、針眼、眼瞼炎（眼瞼潰爛）、眼睛癢

## 用法及用量

請1天3~6次，1次2~3滴 滴眼。  
請務必遵守規定用法、用量。  
使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。  
避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。  
請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。  
僅供點眼使用。

## 成分及分量

Sodium Sulfamethoxazole 4.00%  
Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25%  
Chlorpheniramine Maleate 0.03%  
Taurine (Aminoethyl Sulfonic Acid) 0.10%

## 添加劑

Sodium borate,pH adjusting agent,Benzalkonium chloride,Edetate sodium,Polysorbate 80

## 成分及分量相關的注意事項

本藥劑點眼後，口中可能感到苦味或甜味，苦味為有效成分的sulfamethoxazole而甜味為有效成分的dipotassium glycyrrhizinate所造成，無須擔憂。

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）  
●請勿長期連續服用

### 諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
正在接受醫師治療的人。  
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。  
有下列症狀的人。  
劇烈的眼睛痛  
使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
皮膚：  
發疹、發紅  
發癢  
眼睛：  
充血  
發癢  
腫脹  
●即使使用3~4天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。  
請置於兒童無法觸及之處保管。  
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）  
請勿與他人共用  
請勿置於汽車儀表板等高溫場所。（可能造成容器變形或藥液品質惡化）  
請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）  
依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。

**【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。