

NARON ACE T

- ◆NARON ACE T 是含有 2 种解热镇痛成分的解热镇痛药。
- ◆可抑制疼痛根源的布洛芬，配合可抑制疼痛传导的止痛灵的镇痛作用，在溴米索伐、无水咖啡因的协助下，可对疼痛、发热发挥功效。
- ◆此药剂为易服用的小型药片。

效能

- ◆头痛、月经痛(生理痛)、牙痛、拔牙后疼痛、腰痛、肩膀酸痛、肌肉痛、关节痛、跌打痛、挫伤疼痛、骨折疼痛、外伤疼痛、神经痛、咽喉痛、耳痛的镇痛
- ◆在恶寒（发烧引起的发冷）、发烧时解热

用法及用量

请尽量避免空腹时，按以下用量并配合水或温开水服用。但是，服用间隔时间为 4 小时以上。

15 岁以上，1 次 2 片，1 天 3 次

未满 15 岁，不宜服用

注意

请严格遵守规定的用法用量。

药片的取用方法

指尖用力按下装有药片的 PTP 板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。(以包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故)

成分

2 片中

布洛芬 144mg

止痛灵 84mg

溴米索伐 200mg

无水咖啡因 50mg

添加剂

二氧化硅，羟丙基纤维素，羟丙甲纤维素，交联羧甲基纤维素钠，滑石，硬脂酸镁，乳糖，食用黄色 5 号，纤维素

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)

- 下述人群不要服用
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。
因服用本药剂或其他解热镇痛药、感冒药而引发过哮喘的人群。
未满 15 岁的儿童。
预产期在 12 周以内的孕妇。

- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品
其他解热镇痛药、感冒药、镇静药、晕车药

- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类
(会出现嗜睡症状)

- 请不要在服用前后饮酒

- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
哺乳期人群。
老年人。
因药物等出现过过敏症状的人群。
接受以下诊断的人群。
心脏病，肾脏病，肝脏病，全身性红斑狼疮，混合结缔组织病

患有过以下疾病的人群。

胃及十二指肠溃疡，溃疡性大肠炎，克隆氏症

- 服用后，如果出现下述症状，有可能是副作用，请立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、牙科医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：出现起疹发红、发痒、淤青

消化系统：恶心呕吐、食欲不振、胃部不适感、胃痛、口腔溃疡、烧心、胃胀、肠胃出血、腹痛、腹泻、血便

精神神经系统：头晕

循环系统：心悸

呼吸系统：气短

其他：视线模糊、耳鸣、浮肿、鼻血、牙龈出血、止血困难、出血、背部疼痛、体温过度降低、全身无力

- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红等症状持续或急剧恶化。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。

无菌性脑膜炎：因颈部抽筋出现剧烈头痛、发烧、恶心及呕吐等症状。（尤其在接受全身性红斑狼疮或混合结缔组织病治疗的人群中多有该症状的报告案例。）

哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。

再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等状况。

粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

便秘、嗜睡

- 即使服用 5~6 次仍不见症状好转时，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、牙科医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿服用超过使用期限的产品。

31

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。