

RiUP PLUS

敏諾西代：直接作用於真皮乳頭細胞的生髮成分

l-薄荷腦：抑制頭皮搔癢，賦予清涼感

生育醇醋酸酯：防止皮脂氧化，保護頭皮

泛醇乙醚：為毛囊細胞補充營養

◆RiUP PLUS 為添加有效成分 minoxidil、pantothenyl ethylether、tocopherol acetate、l-Menthol 的男性專用生髮劑。

◆Minoxidil 針對毛囊直接作用，發揮生髮、養髮效果，同時其他成分更調整頭皮環境、賦予清涼感。

效用及效果

用於早年禿髮的生髮、育髮及預防持續禿髮（掉髮）。

用法及用量

成年男性（20 歲以上），每日 2 次，每次 1mL，塗抹於禿髮的頭皮之上。

無論禿髮範圍大小，請遵守每次 1mL 的使用量。以 1mL 用量延展即可充分塗抹於全頭皮的藥量設計。

此外，容器為可取用 1mL 的款式。

注意事項

- 即使以超出規定用法、用量的範圍使用或頻繁使用效果並不變。請務必遵守規定用法、用量。（即使超出規定用量使用，不僅效果不變，更將造成副作用產生的可能性增加）
- 請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。
- 如沾附藥劑的雙手接觸眼睛等黏膜部位將造成刺激，因此請將沾附於雙手的藥劑徹底洗淨。
- 請避免與可能受酒精成分溶解之物（眼鏡框、化學纖維等）接觸。
- 造型劑及美髮造型噴霧請於使用本藥劑後使用。
- 使用染髮劑（造型染髮、染髮、染白髮等）時，請於染髮流程完全結束後再行使用。

成分及分量

100mL 中

敏諾西代 1.0g

泛醇乙醚 1.0g

生育醇醋酸酯 0.08g

l-薄荷腦 0.3g

添加劑

洋甘菊油，1,3-丁二醇，檸檬酸，乙醇

使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用。

●符合下列情形者請勿使用。

曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。

女性。

女性請使用 RiUP 系列女性專用產品。

未成年人（未滿 20 歲）。

於日本國內未有使用經驗。

早年禿髮以外的禿髮症者（例如：斑禿、因甲状腺疾病所引起的禿髮等）或原因不明的禿髮症者。

本藥劑僅對早年禿髮有效。

急速禿髮，頭髮呈斑狀脫落者。

屬於非早年禿髮的禿髮症可能性較高時。

●請勿用於下列部位。

本藥劑僅供頭皮使用，請勿內服。

可能造成血壓下降等。

出現傷口、濕疹或發炎症狀（發紅）等的頭皮。

可能造成傷口惡化。

●使用本藥劑時，請避免於頭皮使用其他生髮劑或外用藥（軟膏、液劑等）。另外，如使用以上藥劑時，請停止使用本藥劑。

該藥劑可能影響本藥劑的吸收效果。

諮詢事項

- 符合下列情形者請在使用前諮詢醫師或藥劑師。
 - 曾因藥物或化妝品等引發過敏症狀者（例如：出疹、發紅、搔癢、斑疹等）。
 - 高血壓者、低血壓者。
 - 本藥劑可能對血壓造成影響。
 - 罹患心臟或腎臟疾病者。
 - 本藥劑可能對心臟及腎臟造成影響。
 - 浮腫者。
 - 可能造成浮腫症狀加重。
 - 家族及兄弟姐妹中並無早年禿髮者。
 - 造成早年禿髮的主因可能為遺傳。
 - 老年人（65歲以上）。
 - 一般而言老年人容易出現不適症狀。
 - 受診斷為患有下列疾病者。
 - 甲狀腺機能障礙（甲狀腺機能低下症、甲狀腺機能亢進症）。
 - 可能因甲狀腺疾病而造成禿髮。
 - 使用後，出現下列症狀即可能為副作用影響，請立即停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。
 - 皮膚：頭皮出疹、發紅*、搔癢、斑疹、頭皮屑、使用部位的灼熱感等
 - *：可能出現於頭皮以外的部位。
 - 精神神經系統：頭痛、意識模糊、暈眩
 - 循環器官：胸痛、心跳速度加快
 - 代謝系統：原因不明的體重急速增加、四肢浮腫
 - 使用一年後，下列任一症狀未見改善時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。
 - 禿髮狀態程度、生髮或細軟髮生長、粗硬髮生長、掉髮程度。（粗硬髮之外，細軟短髮的掉髮亦有所減少即可視為獲得改善。）
 - 可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。
 - 即使於開始使用後的一年內，如禿髮狀態惡化或發生下列禿髮現象時，請停止使用並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師。
 - 頭髮以外的掉毛，毛髮呈斑狀脫落者、急速毛髮脫落等。
 - 可能屬於早年禿髮以外的禿髮症或其他因素所造成的禿髮。

其他注意事項

- 毛髮生長需要一段時間。感受效果最短需要 6 個月，因此請每日持續使用。
 - 本藥劑有效性為使用 6 個月之後出現。
- 毛髮生長程度因人而異，本藥劑並非對所有使用者皆有效。
- 為了維持效果，必須持續使用，如停止使用可能逐漸恢復原本狀態。
 - 本藥劑並非解決早年禿髮原因的藥物。

保管及使用上的注意事項

- 使用後，請旋緊瓶蓋，避免日光直射、高溫、寒冷之處，置於陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 為避免誤用並確保品質，請勿換裝於其他容器。
- 請遠離火源。
- 請勿使用超過使用期限的產品。

43

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。