

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

頭痛・熱に速効

# ナロンエースR

第2類医薬品

〈解熱鎮痛薬〉

イブプロフェン・エテンザミド+胃粘膜保護成分配合

- ◆ナロンエースRは、痛みのメカニズムを解析し、5つの成分を配合した、つらい頭痛に速く効く解熱鎮痛薬です。
- ◆2種類の解熱鎮痛成分(イブプロフェン、エテンザミド)の働きをプロモバレリル尿素、無水カフェインが助け、痛み・熱に効果を発揮します。
- ◆また乾燥水酸化アルミニウムゲルが胃粘膜を保護し、胃の荒れを防ぎます。
- ◆服用しやすい小型の錠剤です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### ① 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15才未満の小児。

#### ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

#### ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

#### ④ 服用時は飲酒しないでください

#### ⑤ 長期連用しないでください



## 相談すること

#### ① 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
- (8) 次の病気にかかったことのある人。  
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

#### ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

- #### ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
- 便秘、下痢

## 効 能

- ◆頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛・神経痛・咽喉痛・耳痛の鎮痛
- ◆発熱・悪寒時の解熱



## 用法・用量

次の量をなるべく空腹時をさけて服用してください。  
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 令	15才以上	15才未満
1 回量	2 錠 	服用しないこと 
服用回数	1日3回まで	

### 【注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、表面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



このようにお飲みください



大人 1回 2錠を  
コップ 1 杯の水  
又はぬるま湯で



空腹時の服用を  
さけるため、  
なるべく食べ物や  
飲み物を  
とってから



## 成 分

2 錠中

成 分	分 量	はたらき
イブプロフェン	144mg	2つの成分の組み合わせがさまざまな痛み、熱の症状をおさえます。
エテンザミド	84mg	
プロモバレリル尿素	200mg	イブプロフェンとエテンザミドのはたらきを助けます。
無水カフェイン	50mg	
乾燥水酸化アルミニウムゲル	66.7mg (6 錠中200mg)	胃粘膜を保護して、胃の荒れを防ぎます。

添加物：無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ヒプロメロース、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、乳糖、青色1号、タルク

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)