

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



ブロムヘキシン塩酸塩配合

パブロンS

第2類医薬品

(総合かぜ薬)

- ◆パブロンSは、たんを出しやすくするブロムヘキシン塩酸塩を配合した総合かぜ薬です。
- ◆9つの有効成分が、かぜの不快感を効果的に改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

4 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5 服用時は飲酒しないでください

6 長期連用しないでください



相談すること

1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに右記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しき等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 便秘、口のかわき

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	15才以上	11~14才	7~10才	3~6才	1~2才	1才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと
服用回数	1日3回					

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

効能

かぜの諸症状(せき、たん、のどの痛み、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

せき・たんにつ



のどの痛み・
発熱等に



くしゃみ・
鼻みず・
鼻づまりに



成分

1包(1.2g)中

ブロムヘキシソリン塩酸塩	4mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
d-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
アセトアミノフェン	300mg	発熱、頭痛、のどの痛み等、熱と痛みをしずめます。
リゾチーム塩酸塩	20mg(力価)	鼻の炎症をしずめ、たんをやわらかくして、出しやすくします。
マレイン酸カルピノキサミン	2.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめます。
ビスイプチアミン(ビタミンB ₆ 誘導体)	8mg	かぜの時に消費しやすいビタミンを補給します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	4mg	

添加物：D-マンニトール、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、グリチルリチン酸2K、香料、バニリン

【注意】本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。




くすりのQ&A

Q 食後に服用することになっていますが、食欲がない時はどうしたらいいですか？

A ビスケットや牛乳等、少量でも食べ物・飲み物をとってから服用してください。

一般にかぜ薬は「食後なるべく30分以内に服用する」ことになっています。それはかぜ薬に入っている熱や痛みをとる成分が胃酸の量を多くし、胃を荒らす場合があるからです。ですから、食欲がなくてきちんと食事がとれない時でも、食べやすいものを少量でも胃に入れてから服用するようにしてください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)