

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。



頭痛・生理痛・発熱に
ナロンエース 第2類医薬品
イブプロフェン・エテンザミド配合 (解熱鎮痛薬)

◆ナロンエースは、イブプロフェン・エテンザミドの組み合わせが、さまざまな痛み、熱の症状をおさえます。
◆服用しやすい小型の錠剤です。

Please be sure to read the instructions carefully before use.
Store this instruction leaflet in a safe place for later reference.
For headaches, menstrual pain, fever

NARON ACE
(ANTI-PYRETICS AND ANALGESICS)

◆Naron Ace, with a combination of ibuprofen and ethenzamide, relieves symptoms of pain and fever.

◆A small, easy-to-swallow tablet.
CAUTIONS FOR USE
[To be avoided!]

Be sure to read this!

(Failure to observe the following may result in the symptoms worsening or adverse reactions/accidents occurring.)

- This medication should not be used by the following persons:
 - Persons who experience an allergic reaction to this medication
 - Persons who suffer from asthma after using this medication or any other anti-pyretics and analgesics or cold remedies
 - Children under 15 years old
- This medication should not be used in combination with the following medications:
 - Other anti-pyretics and analgesics, cold remedies, sedatives, or medications for motion sickness
- Do not drive or operate machinery after using this medication. (It may cause drowsiness)
- Do not consume alcohol when using this medication.
- Do not use this medication for a prolonged period of time.

[Consult a physician for the following]

- The following persons should consult a physician, dentist or pharmacist before using this medication.
 - A person undergoing medical treatment from a physician or dentist
 - A pregnant woman or a woman suspected of being pregnant
 - A mother who is breast-feeding a child
 - An elderly person
 - A person prone to allergies or with a family history of allergies
 - A person with a medical history of being allergic to medicines
 - A person diagnosed as having the following:
 - cardiac disease, renal disease, hepatic disease, systemic lupus erythematosus, or mixed connective-tissue disease
 - A person with a medical history of the following:
 - gastric/duodenal ulcer, ulcerative colitis, Crohn's disease
- In the following cases, discontinue use immediately and consult a physician, dentist or pharmacist. Take the instruction leaflet with you.
 - When the following symptoms appear after use:

Related areas	Symptoms
Skin	rash, redness, itching
Digestive organs	nausea, vomiting, loss of appetite, stomach pain, gastric discomfort, stomatitis
Central nervous system	dizziness
Other	blurred vision, ringing in the ears (tinnitus), swelling

In very rare cases the following serious symptoms may occur. In this case, consult a physician immediately.

Symptoms' name	Symptoms
Shock (anaphylaxis)	Turning pale with cold hands and feet, cold sweats, breathing difficulties, combined with hives, edema, and a heaviness in the chest soon after use.
Muco-cutaneo-ocular syndrome (Stevens-Johnson syndrome), Toxic epidermal necrolysis (Lyell syndrome)	Violent symptoms, such as a rash, redness and burn-like blisters appearing all over the body and in the mucosa of the mouth and eyes accompanied by a high fever.
Hepatic function failure	The whole body feels fatigued, the appearance of jaundice (the skin and whites of the eyes turn yellow), etc.
Renal function failure	The volume of urine decreases accompanied by swelling of the whole body followed by breathing difficulties, fatigue, nausea, vomiting, and blood and protein in the urine.
Non-bacterial meningitis	Symptoms of severe headaches, fever, nausea, and vomiting accompanied by neck muscle rigidity. (Such symptoms are mostly reported in patients undergoing treatment for systemic lupus erythematosus or mixed connective-tissue disease.)
Asthma	

- When the symptoms do not improve after having used this medication 5 or 6 times.
- The following symptoms may appear. If these symptoms continue or worsen, discontinue use and consult a physician, dentist or pharmacist.
 - Constipation, diarrhea

Concerning efficacy, dosage, direction, composition, handling, and storage, please refer to the instructions overleaf.



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15才未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
 - 心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
 - 次の病気にかかったことがある人。
 - 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首筋のつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている)

ぜんそく

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷汗、息苦しさ等があらわれる。

効 能

- ◆頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・ねんざ痛・骨折痛・外傷痛・神経痛・咽喉痛・耳痛の鎮痛
- ◆発熱・悪寒時の解熱



用法・用量

次の量をなるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

- 【注意】**
- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
 - (2)錠剤の取り出し方

年 令	15才以上	15才未満
1回量	2錠 	服用しないこと
服用回数	1日3回まで	

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



このようにお飲みください


痛みははじめたらやめに



大人1回2錠をコップ1杯の水又はぬるま湯で



空腹時の服用をさけるため、なるべく食べ物や飲み物をとってから



成 分

2錠中	成 分	分量	はたらき
	イブプロフェン	144mg	2つの成分の組み合わせがさまざまな痛み、熱の症状をおさえます。
	エテンザミド	84mg	
	プロモバレリル尿素	200mg	イブプロフェンとエテンザミドのはたらきを助けます。
	無水カフェイン	50mg	

添加物：無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ヒプロメロース、タルク、ステアリン酸Mg、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

- 連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
- 電話 03-3985-1800
- 受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

If you have any questions regarding this medication, ask at the store you bought it from or contact the following number:
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., Customer Hotline
Telephone: 03-3985-1800
Office hours: 8:30-21:00 (excluding Saturdays, Sundays and National holidays)

EFFICACY

- ◆Relief of headaches, menstrual pain, toothache, tooth extraction pain, lumbago, stiff shoulder, muscle pain, joint pain, contusion pain, sprain pain, bone fracture pain, traumatic pain, neuralgia, sore throats, and earache
- ◆Antipyretic action when you feel chilly and have a fever

DOSAGE AND DIRECTION

The following dosages should be taken on an empty stomach if possible. Maintain at least a 4-hour interval between dosages.

Age	15 years and over	Under 15 years
One dosage	2 tablets	Do not use
Daily dosage	Up to 3 times a day	

【Cautions】

- (1) Please follow the recommended dosage and directions.
- (2) How to remove a tablet.

As shown in the diagram, firmly push the bulging portion of the PTP (Push Through Pack) sheet containing the tablet with the tip of one finger and break the aluminum film on the rear side. Remove the tablet. (Be careful to avoid swallowing a piece of the packaging sheet by mistake, doing so may injure the esophageal mucosa.)



COMPOSITION in 2 tablets

Components	Content	Activity
Ibuprofen	144mg	The combination of these two components relieves the symptoms of pain and fever.
Ethenzamide	84mg	
Bromovalerylurea	200mg	These components help the activity of ibuprofen and ethenzamide.
Anhydrous caffeine	50mg	

Additives: Anhydrous silicate, Hydroxypropylcellulose, Cellulose, Hypromellose, Talc, Magnesium stearate, Food yellow No.5

CAUTIONS ON HANDLING AND STORAGE

- (1) Store in a cool, dry place free from direct sunlight.
- (2) Keep all medication out of the reach of children.
- (3) Do not transfer this medicine to a different container. (It may be misused or the quality may deteriorate.)
- (4) Do not exceed the period of use.

Production of this product has been approved for domestic sales in accordance with the Pharmaceutical Affairs Law of Japan.



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)