

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

下痢・食あたりに

大正下痢止め〈錠剤〉

第2類医薬品
〈下痢止め薬〉

◆大正下痢止め〈錠剤〉は、各有効成分が、不快な下痢症状を改善するとともに、下痢によって消耗しがちなビタミンB₁・B₂を補給します。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

① 次の人は服用しないでください

本剤又は牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

③ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障

② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効 能





下痢、消化不良による下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便



用法・用量

次の量を1日3回を限度とし服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	4錠 	1日3回まで
11～14才	3錠 	
8～10才	2錠 	
8才未満	服用しないこと 	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

最初に服用する時に

- ①瓶口シールをはがして捨ててください。
- ②詰め物を取り出して捨ててください。
(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)



成分

4錠中

アクリノール水和物	30mg	腸内の有害な細菌に対し、すぐれた殺菌作用をあらわします。	ロートエキス3倍散	51mg (ロートエキスとして17mg)	腸の緊張をやわらげ、下痢によって起こる腹痛を改善します。
ペルペリン塩化物水和物	56mg		チアミン硝化物(ビタミンB ₁)	5mg	下痢によって消耗したビタミンを補給します。
タンニン酸アルブミン	300mg	腸粘膜を保護し、炎症をしずめる収れん作用があります。	リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg	

添加物：セルロース、無水ケイ酸、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、硬化油、トウモロコシデンプン

【注意】本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



治療のポイント

下痢は日常しばしば起こる疾患のひとつですが、その原因は、食べすぎ、消化不良、寝冷え等によるものから、食あたり、細菌性のものまでさまざまです。

身体的・精神的な安静に心がけ、十分な睡眠をとること、また腹部・下肢の保温も大切なことです。



冷たいもの、刺激の強い食べもの等はさげ。最初は、消化がよく胃腸への負担の少ないものから摂取しましょう。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)