

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

患部に貼るだけ 口内炎・舌炎治療薬

口内炎パッチ大正A

第3類医薬品

◆口内炎パッチ大正Aは、“貼る”口内炎・舌炎治療薬です。口腔内ですぐれた付着力をもち、患部を刺激からしっかりカバーし、また、成分が持続的に作用します。



使用上の注意



相談すること



① 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 症状が慢性的な人。
- (5) 患部が広範囲(患部を本剤でおおいきれない)の人。

② 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能

口内炎、舌炎

用法・用量

1 患部に1回1枚、1日1～4回、患部粘膜に付着させて用いてください。

* 本剤は、5才未満の乳幼児には使用させないでください。

【注意】


- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は溶けません。時間がたつと自然にはがれます。(無理にはがさないでください)
- (3) 本剤は口腔内粘膜貼付剤ですから、内服しないでください。
- (4) 5才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 小児への使用においては、貼付後、指ではがしとるおそれがありますので、注意してください。
- (6) 使用方法をまちがえると付着しないことがありますから、使用方法をよく読んで正しくお使いください。
- (7) はがれたものは飲みこまずに捨ててください。

【パッチの貼り方】

パッチの表裏に注意してください。

- ①うがいなどで患部を清潔にした後、患部の水分・唾液などを軽くふき取ってください。
- ②シートからパッチをはがします。表側の濃い赤色の面が、患部につける薬剤面です。(パッチの表裏に注意してください)
- ③パッチの裏側の淡い桃色の面を指先にとります。(この際、指先を少し湿らせておくと、扱いやすくなります)
- ④濃い赤色の薬剤面が患部に接するように貼ってください。
- ⑤指で数秒間おさえた後、そっと指を離してください。

●患部が唾液等でぬれていると、つきにくいことがあります。



成分

1枚(1パッチ)中

成分	分量	はたらき
シコンエキス	0.10mg (シコンとして4.55mg)	患部の炎症を改善します。
グリチルレチン酸	0.15mg	

添加物：ポリアクリル酸、クエン酸トリエチル、ヒプロメロース、エチルセルロース、ヒマシ油、酸化チタン

※本品の主な素材はセルロース類(繊維成分)で、また、赤色は有効成分シコンエキスの色です。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口をきちんと折りまげて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

発売元



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元



帝國製薬株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)