



服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

鼻みず・鼻づまりでつらい時に
1日2回服用〈持続性鼻炎治療薬〉

パブロン鼻炎カプセルS小児用

第2類医薬品

〈鼻炎薬〉

◆パブロン鼻炎カプセルS小児用は、早く溶ける顆粒とゆっくり溶ける顆粒が配合してありますので、1日2回の服用で効果が長続きします。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 次の症状がある人。
前立腺肥大による排尿困難
 - (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- 2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)



- 3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
- 4 長期連用しないでください



相談すること

- 1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
緑内障
 - (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人。
- 2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

- 3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、便秘

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：

くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)



用法・用量

次の量を12時間ごとに服用してください。

年 令	1 回 量	服用回数
7～14才	1 カプセル 	1 日 2 回
7 才未満	服用しないこと	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方
図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成 分


1 カプセル中

成 分	分 量	はたらき
塩酸ブソイドエフェドリン	30mg	血管収縮作用により、鼻粘膜の充血・はれを抑制し、鼻づまりを改善します。
マレイン酸カルピノキサミン	3 mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえます。
ペラドンナ総アルカロイド	0.1mg	分泌抑制作用により、鼻みずをおさえ、なみだ目を改善します。
リゾチーム塩酸塩	7.5mg(力価)	鼻粘膜のはれをしずめる作用があります。
無水カフェイン	25mg	鼻炎に伴う頭重感をやわらげます。

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、タルク、アミノアルキルメタクリレート共重合体RS、ステアリルアルコール、ソルビタン脂肪酸エステル、黄色5号、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いいたします。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)