

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

キリキリした胃痛・腹痛に

ストパン

第1類医薬品

〈鎮痛胃腸薬〉

- ◆ストパンは、ストレスなどによる胃腸の運動の異常によって起こるキリキリ、キューツとさしこむようなつらい胃痛・腹痛に、医療用成分チキウム臭化物が緊張をやわらげ、優れた効果を発揮します。
- ◆1回1カプセルで効き、服用しやすい小型のカプセル剤です。



使用上の注意



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は他の胃腸鎮痛鎮痙薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の診断を受けた人。[症状を悪化させることがあります] 緑内障、前立腺肥大、心臓病、麻痺性イレウス(腸閉塞)、甲状腺機能亢進症、不整脈、潰瘍性大腸炎

2 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

3 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)



相談すること

1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人又は他の医薬品を服用している人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者、体の弱っている人。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
排尿困難

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、胸やけ(胃食道逆流症)
精神神経系	頭痛、頭重感
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難、頻尿、動悸、耳なり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 服用後、数時間たっても激痛がおさまらない場合。
〔他の重篤な疾患[穿孔(胃腸に穴があく)、ヘルニア嵌頓(正常位置から脱出した腸がもとにもどらず、腸閉塞症状を呈する)等]の可能性あります〕

(3) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

(4) 症状の改善がみられても服用期間が1週間を超える場合。
(他の胃腸疾患を見逃すおそれがあるので、漫然と服用しないでください)

3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

本剤の服用により汗が出にくくなることがあるため、高温下での作業等をさけてください。



効 能

胃痛、腹痛、さしこみ(腹部^{せんつう}疝痛)
(本剤は、胃腸の緊張をやわらげる成分を含んでいます)



用法・用量

次の量を服用してください。
服用間隔は5時間以上おいてください。

年 令	15才以上	15才未満
1回量	1カプセル 	服用しないこと 
服用回数	1日3回まで	

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)服用後数時間たっても激痛がおさまらない場合^{*}や、5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
- (3)カプセルの取り出し方
図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



^{*}他の重篤な疾患[穿孔(胃腸に穴があく)、ヘルニア嵌頓(正常位置から脱出した腸がもとにもどらず、腸閉塞症状を呈する)等]の可能性がります。

成 分

1カプセル中

成 分	分量	はたらき
チキジウム臭化物	5 mg	副交感神経を抑制し、胃腸の緊張をやわらげることにより、胃痛、腹痛、さしこみ等の症状をしずめます。

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Na

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)