

私のつらい疲れに

アルフェ エフイーアップ

アルフェ エフイーアップ

第2類医薬品

【使用上の注意】

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】

★肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ★滋養強壮 ★虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成分】 1本（50mL）中

| | |
|--|-----------------------|
| クエン酸鉄アンモニウム | 30mg |
| レマネジン 855 | 100mg（ジオウ 200mg に相当） |
| ジコッピエキス | 24mg（ジコッピ 100mg に相当） |
| サンヤク流工エキス-A | 0.3mL（サンヤク 300mg に相当） |
| グルコン酸カルシウム水和物 | 1000mg |
| L-アスパラギン酸マグネシウム | 500mg |
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ） | 10mg |
| ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ） | 5mg |
| タウリン | 500mg |

添加物：ブドウ糖、D-ソルビトール、アセスルファム K、スクラロース、pH 調節剤、
ポビドン、安息香酸 Na、香料、アルコール、バニリン（アルコール 0.13mL 以下）

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



1本あたり 20kcal

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

大正製薬株式会社²¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号
お客様119番室 電話 03-3985-1800