

복용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.



판매명: alli **약사의 지도가 필요한 의약품**
<내장 지방 감소제>
alli는 Haeon 그룹의 상표입니다

- ◆alli는 주성분이 오르리스타트(Orlistat)이며 내장 지방(복부 둘레)을 감소시키는 약입니다.
- ◆alli는 식사에 포함되는 지방의 흡수를 억제하는 기능이 있습니다.

복용 시 주요 주의사항

이 약을 복용하여 내장 지방(복부 둘레)을 줄이기 위해서는 생활 습관을 함께 개선하는 것(식사 및 운동)이 중요합니다.



사용상의 주의사항



금지 사항

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 쉽게 부작용이 생깁니다)

다음 환자는 복용하지 마십시오.

- (1) 본 약제 또는 본 약제의 성분으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 환자.
- (2) 18세 미만인 환자.
- (3) 다음 약제를 복용하고 있는 환자
시클로스포린 제제(면역 억제제), 항HIV제(에이즈 치료제), 와파린 등의 항응고제
- (4) 다음 진단을 받은 사람.
흡수 장애 증후군(식사를 통한 영양 흡수에 장애가 있음), 담즙울체, 질병이나 약물로 인한 비만(2차성 비만)

- (5) 임신 중이거나 임신일 가능성이 있는 사람.
- (6) 수유중인 사람.
- (7) BMI가 35 이상인 사람 또는 BMI가 25 이상 35 미만이고 다음 진단 중 하나를 받은 사람.

- 내당능 장애(2형 당뇨병·내당능 이상 등)
- 고혈압
- 뇌경색: 뇌혈전증·일과성 뇌허혈 발작(TIA)
- 간질환(NAFLD)
- 혈액 이상·불임
- 폐쇄 수면 무호흡 증후군(OSAS)·비만환기 증후군
- 근골격계 질환: 변형성 관절염(무릎·고관절)·변형성 척추증, 수지 변형성 관절증
- 지질 이상증
- 관상동맥 질환: 심근경색, 협심증
- 비알코올성 지방성
- 폐
- 변형성 관절염
- 비만 관련 신장 질환



상담이

필요한

경우



1 다음과 같은 경우에는 복용 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- (1)의사에게 치료를 받고 있는 사람.
- (2)약물 등으로 인해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- (3)다음 진단을 받은 사람.
췌장염, 담낭 장애(담석 등), 신장 질환
- (4)다음 의약품을 복용중인 사람.
(본 약제와 함께 사용하면 현재 복용중인 약물의 효과에 영향을 미칠 수 있습니다.)
아미오다론 제제(심장약), 레보티록신(갑상선 장애 치료제), 항뇌전증제, 항우울제, 항정신병 약물(리튬 제제 포함), 벤조디아제핀 계열 약제(항불안제, 수면제), 경구 피임약
- (5)건강 검진에서 재검사 또는 정밀 검사의 필요성이 제기된 사람.

2 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지한 후 이 설명서를 지참하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움, 건조함, 수포, 진무름
소화기	메스꺼움·구토, 식욕 부진, 속쓰림, 위통, 위 더부룩함, 극심한 복통, 혈변
정신신경계	불안
비뇨기	배뇨 곤란
기타	몸살

드물게 오른쪽에 기재된 위중한 증상이 나타날 수 있습니다.
이 경우 즉시 의사에게 진료를 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	복용 후 바로 피부 가려움, 두드러기, 목 심, 재채기, 목구멍 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 증상이 발현한다.
간 기능 장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈흰자가 노랗게 변한다), 갈색뇨, 전신 피로감, 식욕 부진 등의 증상이 발현한다.
신장 결석	결석이 요관 내에서 이동할 때 극심한 복통이 나타나고 메스꺼움과 구토를 동반할 수 있다. 혈뇨가 보이는 경우도 있다.

3 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상이 지속되거나 심해질 경우, 복용을 중지한 후 이 설명서를 지참하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.

위통, 복통, 무른 변, 설사, 급한 변의, 배변 횟수 증가 또는 감소, 방귀, 복부 팽만감, 복부 불편감, 변 또는 유분을 동반한 방귀, 변 또는 유분이 새어 나옴, 지방변(지방 또는 기름층이 섞인 변), 지용성 비타민(A, D, E, K) 감소에 따른 다음 증상:

지용성 비타민	지용성 비타민 감소에 따른 증상
비타민 A	눈 불편감(야간 시력 저하, 안구 건조 등), 피부 불편감(피부가 딱딱해지거나 거칠어짐), 반복적인 감염증 발생, 발열, 발진·발적 등
비타민 D	허리·관절·뼈의 통증, 골절, 근력 저하, 근육 통증 등
비타민 E	빈혈(취침거림, 숨이 참, 두근거림 등), 저림·감각 저하 등의 신경 증상 등
비타민 K	멍, 코피, 복부 불편감, 검은 변 지속, 혈변, 탈진, 쉽게 피로함, 어지럼증, 생리 출혈량 증가, 혈뇨 등

4 3개월 이상 복용했음에도 효과가 나타나지 않는 경우, 약사와 상담한 다음 복용 계속 여부를 판단하십시오. 6개월 이상 복용했음에도 효과가 나타나지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 설명서를 지참한 후 의사 또는 약사와 상담하십시오.


기타 주의사항

본 약제는 음식물 속의 지방이 체내에 흡수되는 것을 저하시키는 효과가 있으므로 유분이 새어 나오거나 변 또는 유분을 동반한 방귀, 지방변이 나타날 수 있습니다.
지방분이 많은 식사일수록 유분이 새어 나오거나 변 또는 유분을 동반한 방귀, 지방변이 쉽게 나타납니다.

효능

복부에 살이 많은 사람^{주)}의 내장 지방 및 복부 둘레 감소
(생활 습관 개선을 위해 노력하는 경우에만 해당)

주) 복부 둘레(배꼽 높이): 남성 85cm 이상, 여성 90cm 이상



용법 및 용량

다음 용량을 식사 중 또는 식후 1시간 이내에 물 또는 미지근한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회 용량	복용 횟수
성인(18세이상)	캡슐 1개 	1일3회
18세 미만	복용하지 마십시오	

[주의]

정해진 용법 및 용량을 반드시 지켜 주십시오.
단, 다음과 같은 경우에는 복용하지 마십시오.

식사를 하지 않거나 지방이 거의 포함되지 않은 식사를 한 경우

처음 복용할 때

① 병 입구의 실을 벗긴 후 버리십시오.



② 충전재를 꺼내어 버리십시오.

(이 충전재는 운송 중 캡슐의 파손을 방지하기 위한 것입니다. 이것을 병에 다시 넣거나 빼면 이물질이 혼입될 수 있습니다.)

성분

캡슐 1개 내 오르리스타트(Orlistat) 60mg

첨가물: 셀룰로스, 전분글리콜산 Na, 라우릴황산 Na, 포비돈, 탭크, 젤라틴, 폴리소르베이트 80, 청색 2호, 티타늄옥사이드

보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘하고 습하지 않은 곳에 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 사용기한이 경과된 제품은 복용하지 마십시오.



【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.