

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ビオフェルミン下痢止め
2	成分・分量	9錠(15歳以上の1日服用量)中 タンニン酸ベルベリン 300mg ゲンノショウコ乾燥エキス(ゲンノショウコ約 4,200mg より抽出) 420mg ロートエキス 33mg シャクヤクエキス(シャクヤク約 500mg より抽出) 125mg ビフィズス菌 30mg
3	用法・用量	次の量を1日3回、食後に水またはお湯で服用してください。 15歳以上 1回3錠 11歳～14歳 1回2錠 11歳未満 服用しないこと
4	効能・効果	腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、 くだり腹、軟便
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。) 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください (母乳に移行して乳児の脈が速くなる場合があります。) 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人。 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人。 急性の激しい下痢または腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。 (本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。) 妊婦または妊娠していると思われる人。 高齢者。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 次の症状のある人。 排尿困難 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障 副交感神経遮断剤(ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド、ロートエキス等)を含有する 内服薬を服用している人。 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。