

# BIOFERMIN® ANTIDIARRHEALS

第2类医药品

止泻药

\* Albumin Tannate, 中日老鹳草提取物在腹部温和地发挥停止腹泻的作用。\* Scopolia extract 有效地缓解伴随腹痛的腹泻。\* 乳酸菌调整腹泻时发生的肠内菌紊乱。\* 此药剂为易饮用的, 具有生药特有的香味的浅褐色~茶褐色颗粒。此外条状小包方便携带。

## 效能或效果

腹泻, 伴随腹痛的腹泻, 因消化不良导致的腹泻, 食物中毒, 因饮水而腹泻, 拉肚子, 上吐下泻, 软便

## 用法及用量

请在饭后用水或温水服用以下的量。

15岁以上, 1天3次, 1次1包

11岁~14岁, 1天3次, 1次2/3包

8岁~10岁, 1天3次, 1次1/2包

5岁~7岁, 1天3次, 1次1/3包

未满5岁, 不宜使用

## 用法及用量相关注意

儿童服用时, 请在监护人的指导监督下服用。

请严格遵守规定的用法用量。

## 成分及分量

3包(3.6 g) (15岁以上1天服用量) 中

Albumin Tannate 2700mg

Geranium Herb Extract 600mg

Scopolia Extract 33mg

Streptococcus Faecalis Powder 180mg

## 添加剂

Potato Starch

## 成分相关注意

本产品使用生药(药用的草根木皮等), 因此不同产品细粒的颜色或味道会有所不同, 但是效果不变。

## 使用注意事项

### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化, 或容易出现副作用及事故)

#### ● 下述人群不要服用

因本药剂, 本药剂成分或牛奶出现过过敏症状的人群

#### ● 在服用本药剂期间, 不要服用下述任何医药品

肠胃镇痛镇痉药, 含有莨菪浸膏的其他肠胃药, 晕车药

#### ● 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类(会出现视线模糊, 异常眩光等症状)

#### ● 处于哺乳期时不要服用本药剂, 或在服用本药剂时不要进行哺乳(可能会因转移至母乳中导致婴儿脉搏加快)

## 咨询事项

#### ● 以下人群在服用前应咨询医师, 药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

伴随有发烧的腹泻人群, 便血人群或持续存在粘液便情况的人群。

伴随急性剧烈腹泻, 腹痛, 腹胀, 恶心等症状的腹泻人群。(若强行使用本药剂进行止泻反而可能导致病情恶化。)

孕妇或有其可能性的人群

老年人

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

排尿困难

接受以下诊断的人群

心脏病, 青光眼, 正在服用含副交感神经阻滞药(belladonna total alkaloid, isopropamide iodide, scopolia extract等)的内服药的人群

#### ● 服用后若出现下述症状, 则可能存在副作用, 此时应立即中止服用, 并携带附件书咨询医师, 药剂师或登录贩卖者

皮肤: 起疹, 发红, 发痒

精神神经系统: 头痛

泌尿系统: 排尿困难

其他: 脸部灼热, 异常眩光, 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克(过敏性): 服用后立即出现皮肤发痒, 荨麻疹, 声音沙哑, 打喷嚏, 喉咙发痒, 气闷, 心悸, 意识不清等症状。

#### ● 服用后若出现下述症状, 若症状持续或加重时应中止服用, 并携带附件书咨询医师, 药剂师或登录贩卖者

口腔干燥,视线模糊

●若服用5~6天后症状仍无改善则应中止服用,并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者

### 其他注意事项

●可能导致难以产生母乳。

### 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射,潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

将1包分开服用时,折叠袋口进行保管,并在2天之内服用。

请勿服用超过使用期限的产品。

11

#### 【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的,基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品(或准药物)
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的,仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方(或本公司)临时翻译而成,未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题,提供方(或本公司)概不承担任何责任