

BIOFERMIN® ANTIDIARRHEALS

第2類醫藥品

止瀉藥

* Albumin tannate, 中日老鸛草提取物針對腹部溫和作用, 有效止瀉。* Scopolia extract 對伴隨腹痛的腹瀉有效作用。* 乳酸菌調整腹瀉時的腸道菌叢失調。* 易於服用, 散發天然藥材特有香味的淡褐色~茶褐色細微顆粒。此外並採用便於攜帶的條狀包裝。

療效或效果

伴隨腹瀉, 伴隨腹痛的腹瀉, 因消化不良的腹瀉, 食物中毒, 因飲水而腹瀉, 拉肚子, 上吐下瀉, 軟便

用法及用量

請於餐後以開水或溫水服用以下用量。

15歲以上, 1天3次, 1次1包

11歲~14歲, 1天3次, 1次2/3包

8歲~10歲, 1天3次, 1次1/2包

5歲~7歲, 1天3次, 1次1/3包

未滿5歲者, 請勿使用

用法及用量相關的注意事項

兒童服用時, 請於家長的指導監督下使用。

請務必遵守規定用法, 用量。

成分及分量

3包(3.6 g) (15歲以上的每日服用量) 中

Albumin Tannate 2700mg

Geranium Herb Extract 600mg

Scopolia Extract 33mg

Streptococcus Faecalis Powder 180mg

添加劑

Potato Starch

成分相關的注意事項

本產品採用天然藥材 (藥用草根樹皮等) 提煉而成, 因此產品細粒色調或味道可能稍有不同, 但藥效不變

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守, 現在的症狀會惡化, 或者容易引發副作用, 意外)

● 下列的人請勿服用

曾因本藥劑或本藥劑的成分, 牛奶, 引發過敏症狀的人。

● 服用本藥劑的期間, 請勿服用下列任何一種醫藥品。

胃腸鎮痛鎮痙藥, 含有東莨菪浸膏的其他胃腸藥, 暈車藥

● 服用後, 請勿駕駛操作交通工具或機械類 (可能出現視力模糊, 異常目眩等症狀。)

● 正在哺乳的人請勿服用本藥劑, 或者服用本藥劑的情況下, 請避免哺乳 (本藥劑可能會經由母乳, 使嬰兒的脈搏變快。)

諮詢事項

● 下列的人於服用前, 請諮詢醫師, 藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

有伴隨發燒的腹瀉的人, 有血便的人或持續黏液 便的人。

有伴隨急性的劇烈腹瀉或腹痛, 腹部膨脹, 噁心等 症狀的腹瀉的人。(若以本藥劑勉強止住腹瀉, 可能反而使疾病惡化。)

孕婦或可能懷孕的人。

年長者。

曾因藥品等, 引發過敏症狀的人。

有下列症狀的人。

排尿困難

接受過下列診斷的人。

心臟病, 青光眼, 現正服用含有副交感神經遮斷劑 (belladonna total alkaloid, isopropamide iodide, scopolia extract等) 成分的口服藥物者

● 服用後, 出現下列症狀的情況下, 有可能是副作用, 請立刻停止服用, 攜帶附件, 諮詢醫師, 藥劑師或登錄販賣者

皮膚: 發疹, 發紅, 發癢

精神神經系統: 頭痛

泌尿器官: 排尿困難

其他: 臉發燙, 異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下, 請立即接受醫師診治。

休克 (過敏性): 服用後馬上出現皮膚搔癢, 蕁麻疹, 聲音沙啞, 打噴嚏, 喉嚨發癢, 呼吸困難, 心悸, 意識模糊等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶附件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
口乾、視力模糊
- 即使服用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶附件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

其他注意事項

可能不易分泌母乳。

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
請置於兒童無法觸及之處保管。
單包分次服用時，請將袋口反折保管並於2天內服用完畢。
請勿服用超過使用期限的產品。

11

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品（或準藥物）。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。