

# ビオフェルミン®健胃消化薬錠

健胃・消化

\* 4種の健胃生薬が弱った胃のはたらきをたかめ食欲をすすめます。\* リパーゼなど3種の消化酵素がすぐれた消化作用をあらわし、ガジュツエキスが脂肪の消化をたすけます。  
\* アカメガシワエキス・乳酸菌が胃腸のはたらきを整えます。\* のみやすい、生薬特有の芳香をもった、淡かっ色〜かっ色の錠剤です。

## 効能・効果

○食欲不振、胃弱○食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化促進、消化不良○胃もたれ、胃部・腹部膨満感○胸つかえ、胸やけ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐○整腸（便通を整える）、軟便、便秘

## 用法・用量

次の量を食前または食後に水またはぬるま湯で服用してください。

15歳以上、1回2錠、1日3回

15歳未満 服用しないこと

## 用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守してください。

## 成分及び分量

6錠（15歳以上の1日服用量）中

リパーゼAP6 90mg

ニューラーゼ 210mg

ビオチアスターゼ2000 60mg

ガジュツエキス 30mg（莪朮約600mgより抽出）

ゲンチアナ乾燥エキス 20mg（ゲンチアナ約200mgより抽出）

ケヒ末 120mg

ショウキョウ末 60mg

アカメガシワエキス 65mg（赤芽柏約520mgより抽出）

ラクトミン（乳酸菌） 18mg

## 添加物

トウモロコシデンプン、アメ粉、デキストリン、タルク、ステアリン酸マグネシウム

## 成分に関連する注意

生薬（薬用の草根木皮など）を用いた製品ですから、製品により錠剤の色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりません。

## 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
医師の治療を受けている人。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。  
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## 保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすててください。（詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになります。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです。）

服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。（他のにおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります。）

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。

一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6か月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。

11

### 【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- 本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品（又は医薬部外品）です。
- 多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- 多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- 多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。