

- 排出肠道里的粪便
- 皮硫酸钠水合物及乳酸菌使硬便柔软，促进近乎自然的通路
- 可根据便秘症状调整剂量

效能或效果

- 便秘 ● 缓解便秘所伴随的以下症状：皮肤粗糙,粉刺,头重,上火,食欲不振（食欲减退）,痔疮,肠内异常发酵,腹胀

用法及用量

1天1次，于就寝前服用。但首次应给最小量，观察排便情况及状态的同时慢慢增加或减少。

15岁以上，1天1次，1次3~5片

11岁~14岁，1天1次，1次2~3粒

未满11岁，不宜服用

用法及用量相关注意

请严格遵守规定的用法用量。

药片的取用方法

· 指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

（以板装包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分及分量

5片中（15岁以上1天最大服用量）中

Sodium Picosulfate Hydrate 7.5mg

Bifidobacterium 20mg

Lactomin 20mg

添加剂

Corn starch ,Dextrin,Precipitated calcium carbonate ,Lactose,Maltose Syrup Powder,White Soft Sugar,Magnesium stearate

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 在服用本药剂期间，不要服用下述医药品
其他泻下药（泻药）
- 不要大量服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师,药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
孕妇或有其可能性的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
拥有以下症状的人群
剧烈腹痛,恶心,呕吐
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹,发红,发痒
消化系统：剧烈腹痛,恶心,呕吐,肠鸣,
腹部胀满感
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者
腹泻
- 服用1周左右的时间仍不见症状好转时，请停止服用，并携带附件书咨询医生,药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射,潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

在盒子的“开封年月日”填写栏中，填写内袋（铝袋）的开封日期。

内袋（铝袋）一旦开封后，为了保证质量，请尽量在开封日开始6个月以内，迅速服用。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品（或准药物）
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任