

ビオフェルミン®便秘薬

第2類医薬品

便秘薬

- 腸内にたまった便を出す
- ピコスルファートナトリウム水和物と乳酸菌が硬い便をやわらかくし、自然に近いお通じを促す
- 便秘症状に応じて服用量を調節できる

効能・効果

- 便秘 ●便秘に伴う次の症状の緩和：肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振（食欲減退）、痔腸内異常醗酵、腹部膨満

用法・用量

1日1回就寝前に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量してください。
15歳以上、1回3～5錠、1日1回
11歳～14歳、1回2～3錠、1日1回
11歳未満、服用しないこと

用法・用量に関連する注意

用法・用量を厳守してください。
錠剤の取り出し方
・錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
（誤ってシートのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

5錠（15歳以上の1日最大服用量）中
ピコスルファートナトリウム水和物 7.5mg
ビフィズス菌 20mg
ラクトミン(乳酸菌) 20mg

添加物

トウモロコシデンプン、デキストリン、沈降炭酸カルシウム、乳糖水和物、アメ粉、白糖、ステアリン酸マグネシウム

使用上の注意

してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
- 大量に服用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人。
妊婦または妊娠していると思われる人。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
消化器：はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、腹鳴、腹部膨満感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
下痢
- 1週間間投服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
小児の手の届かない所に保管してください。
他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
箱の「開封年月日」記入欄に、内袋（アルミ袋）を開封した日付を記入してください。
一度内袋（アルミ袋）を開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品(又は医薬部外品)です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。