

- 排出腸道里的糞便
- 皮硫酸鈉水合物及乳酸菌使硬便柔軟，促進近乎自然的通路
- 可根據便秘癥狀調整劑量

## 療效或效果

- 便秘 ● 緩和伴隨便秘的下列症狀：皮膚粗糙,粉刺,頭重,上火,食欲不振（食欲減退）,痔瘡,腸內異常發酵,腹部膨脹

## 用法及用量

1天1次，請於就寢前服用。但第一次請服用最少量，一面觀察通便的情況和狀態，一面慢慢增量或減量。  
15歲以上，1天1次，1次3~5片  
11歲~14歲，1天1次，1次2~3粒  
未滿11歲者，請勿服用

## 用法及用量相關的注意事項

請務必遵守規定用法,用量。

錠劑取出方法

- 以指尖用力按壓藥錠PTP包裝凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出藥錠服用。  
（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

## 成分及分量

5錠中（15歲以上的每日最大服用量）  
Sodium Picosulfate Hydrate 7.5mg  
Bifidobacterium 20mg  
Lactomin 20mg

## 添加劑

Corn starch ,Dextrin,Precipitated calcium carbonate ,Lactose,Maltose Syrup Powder,White Soft Sugar,Magnesium stearate

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

- （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品。  
其他瀉下藥（瀉藥）
- 請勿大量服用

### 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者  
正在接受醫師治療的人。  
孕婦或可能懷孕的人。  
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。  
有下列症狀的人。  
劇烈腹痛,噁心,嘔吐
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶附件，諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者  
皮膚：發疹,發紅,發癢  
消化器官：劇烈腹痛,噁心,嘔吐,腹鳴,腹部膨脹感
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶附件，諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者  
腹瀉
- 服用 1週左右症狀仍未見改善時，請停止服用並攜帶附件諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射,濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。

請於外盒「開封年月日」填寫欄內填入內袋（鋁箔袋）開封日期。

基於品質考量，內袋（鋁箔袋）一經開封，應於開封日起6個月內儘速服用完畢。

**【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品（或準藥物）。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。