

BIOFERMIN®

INTESTINAL REGULATION CHEWABLE®

第三类医药品

肠道调节药

- 二甲基聚硅氧烷会消除产生的气体气泡※，且决明子会整合肠胃，改善腹部胀满（腹胀感）。（※气体气泡：气泡状态的气体）
- 双歧杆菌和乳酸生（乳酸菌）会抑制产生体内气体的有害菌，保持不容易产生体内气体的肠内环境。
- 无水也可饮用的酸奶味咀嚼片。

效能或效果

腹胀,肠胃治理(改善排便),便秘,软便

用法及用量

将以下量,按4小时以上的服用间隔,进行咀嚼或在口中溶解服用。

15岁以上, 1天1次, 1次3片

未满15岁, 不宜使用

用法及用量相关注意

请严格遵守用法和用量

成分及分量

3片中(15岁以上1天服用量)中

Bifidobacterium 30mg

lactomin (Lactic acid bacteria) 30mg

Cassia seed extract 200mg

Dimethyl polysiloxane 180mg

添加剂

Corn Starch,Erythritol,Anhydrous Silicate, Crystalline Cellulose,Hydrogenated Maltose Syrup,White Soft Suger,Hydroxypropyl Cellulose,Ascorbic Acid,Carmellose Calcium,Magnesium Stearate,Sucralose,Aspartame (L-phenylalanine compound),Perfume

成分相关注意

由于本产品是用生药(药用的草根树皮等)制成的,根据产品的不同有可能药片的颜色以及味道会有所不同,但是不影响效果
少数情况下药片会有黑点出现,这是决明子成分引起的,没有质量问题。

使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师,药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
接受以下诊断的人群
苯丙酮尿症
- 若服用2周左右后症状仍无改善则应中止服用,并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)

打开盖子后请将容器内的填充物扔掉。(如果将填充物再次放进容器子中的话因为含有湿气会导致变质。填充物是为了防止药剂在运输过程中发生破损。)

服用后务必盖好容器盖。(会发生其他味道移味,吸湿而发生变质。)

请勿服用超过使用期限的产品。

在箱子和容器的“开封年月日”标注栏中,记录容器的开封日期

一旦开封后,为了保证质量,请尽量在开封日开始6个月以内,迅速服用

21

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的,基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品(或准药物)
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的,仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方(或本公司)临时翻译而成,未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题,提供方(或本公司)概不承担一切责任