

BIOFERMIN®

INTESTINAL REGULATION CHEWABLE®

제3류 의약품

정장약

●디메틸폴리실록산이 발생한 가스 기포※를 깨, 결명자가 장 기능을 정돈하고, 더부룩함(복부 팽만감)을 개선합니다.(※가스 기포: 거품 같은 상태의 가스)●비피더스균과 스트렙토코커스 패칼리스가 가스 발생의 원인인 장내 나쁜 균의 증식을 억제, 가스가 발생하기 어려도록 장내 환경을 정돈해줍니다.●물 없이 마실 수 있는 요구르트향 츄어블정입니다.

효능 또는 효과

복부 팽만감, 정상(배변 조절), 변비, 연변

용법 및 용량

다음의 양을 4시간 이상의 복용간격으로 씹거나 입 안에서 녹여서 복용하십시오.

15세 이상, 1회 1정, 1일 3회

15세 미만 복용하지 말 것

용법 및 용량에 관한 주의

용법·용량을 엄수하십시오.

성분 및 분량

3정(15세 이상의 1일 복용량) 중

Bifidobacterium 30mg

lactomin (Lactic acid bacteria) 30mg

Cassia seed extract 200mg

Dimethyl polysiloxane 180mg

첨가물

Corn Starch, Erythritol, Anhydrous Silicate, Crystalline Cellulose, Hydrogenated Maltose Syrup, White Soft Sugar, Hydroxypropyl Cellulose, Ascorbic Acid, Carmellose Calcium, Magnesium Stearate, Sucralose, Aspartame (L-phenylalanine compound), Perfume

성분 관한 주의

생약(약용 초근목피 등)을 사용한 제품이므로, 제품에 따라 정제의 색깔과 맛이 다소 다를 수 있지만, 효과는 문제 없습니다. 드물게 정제에 검은 점이 보이는 경우가 있으나, 이는 결명자에 의한 것으로 품질에는 문제 없습니다.

사용상의 주의

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
의사의 치료를 받고 있는 사람.
다음의 진단을 받은 사람.
페닐케톤 뇨증
- 2주 정도 복용해도 증상이 나아지지 않으면 복용을 중단한 후, 첨부문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

용기 안의 충전재 은 뚜껑을 개봉한 후 버릴 것.(충전재 다시 용기 넣을 경우 습기를 포함해 품질이 변하는 원인이 될 수 있다. 충전재 은 수송 중에 정제가 파손되는 것을 방지하기 위한 것이다.)

복용 할 때마다 용기의 뚜껑을 단단히 조여주십시오.(다른 냄새가 옮겨지거나 흡습하여 품질이 변한다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

상자와 용기의 '개봉년월일' 기입란에 용기를 개봉한 날짜를 기입하십시오.

한 번 개봉한 후에는 품질유지 차원에서 개봉일로부터 6개월 이내를 기준으로 가급적 빨리 복용할 것.

21

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품.(또는 의약 부외품)입니다
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..