

BIOFERMIN®

INTESTINAL REGULATION CHEWABLE®

第三類醫藥品

整腸藥

◆ 透過消除由二甲基聚矽氧烷引起的氣體氣泡，決明子能調整腸道功能，改善腹部的脹滿感。(※氣體氣泡：氣泡狀的氣體) ◆ 雙歧桿菌及乳酶生(乳酸菌)能抑制產生腸道氣體的惡玉菌的增加，調整腸內環境以致難以產生氣體。◆ 無須配服開水，可直接服用的乳酪口味咀嚼錠。

療效或效果

腹部膨脹感,整腸(通便),便秘,軟便

用法及用量

以下份量,請每隔4小時以上服用,咬碎或在口中溶解後吞服。

15歲以上,1天1次,1次3片

未滿15歲者,請勿使用

用法及用量相關的注意事項

請嚴守用法及用量

成分及分量

3錠中(15歲以上的每日服用量)

Bifidobacterium 30mg

lactomin(Lactic acid bacteria) 30mg

Cassia seed extract 200mg

Dimethyl polysiloxane 180mg

添加劑

Corn Starch,Erythritol,Anhydrous Silicate, Crystalline Cellulose,Hydrogenated Maltose Syrup,White Soft Suger,Hydroxypropyl Cellulose,Ascorbic Acid,Carmellose Calcium,Magnesium Stearate,Sucralose,Aspartame(L-phenylalanine compound),Perfume

成分相關的注意事項

本藥因由天然藥材(藥用的草根木皮等)製成,根據產品的不同藥劑的顏色,味道會有差異,但不影響藥效。

藥劑可能會有黑點,這是因為含有決明子成份,不是品質的問題。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 下列的人於服用前,請諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
接受過下列診斷的人。
苯酮尿症
- 即使服用2週左右,症狀也沒有改善的情況下,請停止服用,攜帶附件,諮詢醫師,藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到 濕氣少的陰涼處蓋緊。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

開瓶後請將容器中填充物丟棄。(將填充物再次放入容器中可能因所吸收的濕氣而造成錠劑變質。填充物為防止運送過程錠劑破損之用。)

每次服用後請旋緊容器蓋。(避免吸收其他氣味或濕氣而造成變質。)

請勿服用超過使用期限的產品。

請於包裝盒及瓶身的「開封年月日」欄中填寫開封日期

基於品質考量,一旦開封,請於開封日起6個月內儘速服用完畢

21

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的,基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品(或準藥物)。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译,仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者(或本公司)的暂时翻译,将来可能会被修改或变更,恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题,提供者(或本公司)不负任何法律责任。