

BIOFERMIN® INTESTINAL REGULATION CHEWABLE® a

- 二甲基聚硅氧烷会消除产生的气体气泡^{*}，且决明子会整合肠胃，改善腹部胀满（腹胀感）。（※气体气泡：气泡状态的气体）
- 乳酸菌（双歧杆菌和乳酶生）会抑制产生体内气体的有害菌，保持不容易产生体内气体的肠内环境。
- 泛酸钙维护肠道中乳酸菌的生长。
- 无水也可饮用的酸奶味咀嚼片。

效能

腹胀，肠胃治理（改善排便），便秘，软便

用法及用量

将以下量，按 4 小时以上的服用间隔，进行咀嚼或在口中溶解后服用。

15 岁以上，1 次 1 片，1 天 3 次

未满 15 岁，不宜使用

用法及用量相关注意

- 请严格遵守用法和用量。
- 本药请务必进行咀嚼或在口中溶解后服用。
(如果直接吞咽，可能会造成喉咙堵塞。)

成分

3 片中（15 岁以上 1 天服用量）中

双歧杆菌 30mg

乳酶生 30mg

决明子提取液 120mg（从约 1200mg 的决明子中提取）

二甲基聚硅氧烷 180mg

泛酸钙 S 型 34.6mg（相当于 22.5mg 的泛酸钙）

添加剂

玉米淀粉，赤藓糖醇，硅酸酐，纤维素，还原麦芽糖浆，糖粉，白糖，羟丙基纤维素，抗坏血酸，CMC-Ca，硬脂酸镁，乳酸钙，三氯蔗糖，阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物），香料

成分相关注意

- 由于本产品是用生药（药用的草根树皮等）制成的，根据产品的不同有可能药片的颜色以及味道会有所不同，但是不影响效果。
- 少数情况下药片会有黑点出现，这是决明子成分引起的，不是质量问题。

使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师，药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群。
接受以下诊断的人群。
苯丙酮尿症
- 若服用 2 周左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带附件书咨询医师，药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 打开盖子后请将容器内的填充物扔掉。（如果将填充物再次放进容器内的话因为含有湿气会导致变质。填充物是为了防止药剂在运输过程中发生破损。）
- 每次服用后请务必盖好容器盖。（以免发生其他味道移味，吸湿而发生变质。）
- 请勿服用超过使用期限的产品。
- 在箱子和容器的“开封年月日”标注栏中，记录容器的开封日期。
- 一旦开封后，为了保证质量，请尽快在开封日开始 6 个月以内服用完毕。

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。