

●配合了乳酸菌和维生素C,B2和B6 ●改善肠道环境改善排便在大肠中起作用的双歧杆菌和在小肠中起作用的乳酸菌可调整肠道环境,并且对便秘和腹胀(腹部饱胀感)有效。●大小容易吞服的柠檬色片剂

效能或效果

肠胃治理(改善排便),便秘,腹胀,软便

用法及用量

请按以下用量并配合水或温开水服用:

15岁以上, 1天3次, 1次2片

未满15岁, 不宜服用

用法及用量相关注意

请严格遵守规定的用法用量。

成分及分量

6錠中(15岁以上1天服用量)中

Bifidobacterium 18mg

Lactomin 18mg

Vitamin C (Ascorbic acid) 500mg

Vitamin B2 (Riboflavin) 6mg

Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 12mg

添加剂

Corn starch, Reduced maltose syrup, Carboxymethylcellulose calcium, Erythritol, Magnesium stearate, Aspartame (L-phenylalanine compound), Silicon dioxide

成分相关注意

接受尿液以及大便检查时, 请告知医生正在服用本药剂(有可能会影响尿液以及大便的检查值)

服用本药剂, 可能会出现尿液变黄的情况, 这是因本药剂中的维生素B2 (Riboflavin)引起的现象, 因此不用担心

药片中可能会出现其成分维生素B2 (Riboflavin)引起的红色斑点, 但是效果不变。

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师,药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

接受以下诊断的人群

苯丙酮尿症

●服用后若出现下述症状, 则可能存在副作用, 此时应立即中止服用, 并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者

消化系统: 恶心,呕吐

●服用后若出现下述症状, 若症状持续或加重时应中止服用, 并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者

腹泻

●若服用1个月左右后症状仍无改善则应中止服用, 并携带附件书咨询医师,药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)

打开盖子后请将瓶内的填充物扔掉。(如果将填充物再次放进瓶子中的话因为含有湿气会导致变质。填充物是为了防止药剂在运输过程中发生破损。)

服用后务必盖好瓶盖。(会发生其他味道移味,吸湿而发生变质。)

请勿服用超过使用期限的产品。

在盒子和瓶子的“开封年月日”标注栏中记下开瓶日期

一旦开封后, 为了保证质量, 请尽量在开封日开始6个月以内, 迅速服用

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品（或准药物）
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任