


	製品名 メディトリートクリーム		
	使用期限 48ヶ月		セルフメディケーション 税 控除 対象
	小分類名 膣カンジダ再発治療薬	第1類医薬品	

製品特徴

●カンジダ菌は、健康な女性でも皮膚、口の中、消化管、膣に存在します。膣カンジダは、かぜ、疲労、ストレスなどで免疫機能が低下したり、以下の要因で膣の中のカンジダ菌が増殖し、発症する疾患で、膣のかゆみ、おりもの（白色）、発赤、熱感、痛みを生じます。一度発症すると再発しやすい疾患です。

ホルモンの変化（月経前）、抗生物質、ピル、妊娠、糖尿病、服装（湿ったり、きつい下着）

●メディトリートクリームは、有効成分のミコナゾール硝酸塩がカンジダ菌に対して強い抗菌作用を示し、不快な症状をやわらげる外陰用クリームです。膣症状を伴う場合は、必ずメディトリートと併用してご使用ください。

効能・効果

膣カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）ただし、膣症状（おりもの、熱感等）を伴う場合は、必ず膣剤（膣に挿入する薬）を併用してください。

成分 1g中

ミコナゾール硝酸塩 10mg

添加物：ポリオキシエチレンセチルエーテル、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、セタノール

用法・用量

成人（15歳以上60歳未満）、1日2～3回、適量を患部に塗布してください。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。

(1) 外陰部症状のみの場合：本剤を使用してください。膣剤（膣に挿入する薬）との併用が望まれます。

(2) 膣症状（おりもの、熱感等）を伴う場合：本剤に膣剤（膣に挿入する薬）を併用してください。

※ご使用前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、使用してください。

配送情報はこちら

包装	画像	梱包サイズ 重量	JAN コード	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
10g		W117×D24×H30mm	 4987306016590		1,342円