

	<b>製品名</b> クリニラボ ヘパリオローション	
	<b>使用期限</b> 36ヶ月	
	<b>小分類名</b> 皮膚治療薬	<b>第2類医薬品</b>

**製品特徴**

●クリニラボ ヘパリオローションは、3つの有効成分が、乾燥で荒れた肌を修復するローションタイプの皮膚用薬です。

- ・ヘパリン類似物質（保湿・抗炎症・血行促進作用）  
角質層構造を整え、肌内部の水分を保持
- ・アラントイン（皮膚修復・抗炎症作用）  
乾燥により荒れた肌組織を修復
- ・トコフェロール酢酸エステル（血行促進作用）  
血行を促進し、組織修復を促進

●無香料。さっぱり・よくのびるローションタイプです。

※ご購入できる薬局・薬店に限られていますので、大正製薬お客様119番室にお問合せください。

**効能・効果**

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

**使用上の注意**
**■してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
  - (1) 出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人。
  - (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。
  - (血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)
2. 次の部位には使用しないでください
  - 目、粘膜（口腔、鼻腔、膣など）

**■相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

**成分（100g 中）**

ヘパリン類似物質	0.3g
アラントイン	0.2g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g

添加物：プロピレングリコール、dl-ピロリドンカルボン酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、パラベン、エデト酸Na、BHT、pH調節剤、ヒアルロン酸Na

**用法・用量**

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのぼして貼ってください。

**用法・用量に関連する注意**

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
  - (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
- なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- ※出血のある傷口には使用しないでください（血が止まりにくくなる場合があります。）
- ※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

**配送情報はこちら**

包装	画像	梱包サイズ 重量	JAN コード	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
60g		W50×D40×H117mm	 4987306050204		1,518円