
	製品名 クリニラボ メディオイドPVAクリーム	 セルフレディースン 税 控除 対象
	使用期限 36ヶ月	
	小分類名 皮膚治療薬	指定第2類医薬品

製品特徴

●**クリニラボ メディオイドPVAクリーム**は、抗炎症成分として、ミディアムランクのステロイド成分[プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル]を配合したステロイド外用剤<湿疹、皮膚炎治療薬>です。

- プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルは、患部で効き、体内で低活性化するステロイド*1です。
- かゆみ止め成分[クロタミトン]、血行促進成分[トコフェロール酢酸エステル]、殺菌成分[イソプロピルメチルフェノール]が配合されています。
- ものを触っても気にならないように、べたつかずさらっとなじむクリームです。
- 見られたくない手湿疹等にお使いいただけます*2。

*1 アンテドラッグステロイドのこと。皮膚表面の患部で優れた抗炎症効果を発揮し、体内では分解されて低活性になるステロイド。

*2 手以外にも、デコルテ、首元、顔、腕、脚、頭皮、背中、ひじ・ひざの裏などにもお使いいただけます。

顔への広範囲、長期の使用は特に避けてください。目および目の周囲には使用しないでください。

デリケートな部位への使用はおすすめしておりません。特に、粘膜部分には使用しないでください。

※ご購入できる薬局・薬店が限られていますので、大正製薬お客様119番室にお問い合わせください。

効能・効果

湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2) 目の周囲、粘膜等。
- ② 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- ③ 長期連用しないでください。

■相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品ページを見せながら、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品ページを見せながら、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分（100g 中）

プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg
クロタミトン	50mg
トコフェロール酢酸エステル	5mg
イソプロピルメチルフェノール	1mg

添加物：ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、パラベン、ステアリルアルコール、セタノール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチル、トリエタノールアミン

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦してください。

■用法・用量に関する注意■

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

配送情報はこちら

包装	画像	梱包サイズ 重量	JAN コード	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
15g		W118×D21×H31mm 26g	 4987306050518		1,518円