

医薬品を正しく購入するための 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	クラリチンEX
2	成分・分量	1錠中 ロラタジン 10mg
3	用法・用量	成人(15才以上)、1回1錠、1日1回食後に服用してください。 なお、毎回同じ時間帯に服用してください。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和: 鼻みず、鼻づまり、くしゃみ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none">1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2) 15才未満の小児。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、催眠鎮静薬等)、エリスロマイシン、シメチジン3. 服用前後は飲酒しないでください4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください5. 次に該当する人はお申し出ください<ul style="list-style-type: none">・医師の治療を受けている人。・次の診断を受けた人。 肝臓病、腎臓病、てんかん・アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人。・気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。・妊婦又は妊娠していると思われる人。・高齢者。・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。