

# クラリチン EX

- ◆クラリチン EX は、第2世代抗ヒスタミン成分ロラタジンを含有するアレルギー専用鼻炎薬です。
- ◆眠くなりやすく、「集中力、判断力、作業効率の低下」を起こしにくいお薬です。
- ◆1日1回1錠の服用で、鼻みず・鼻づまり・くしゃみの症状に、効き目が長く続きます。

## 効能

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：  
鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

## 用法・用量

成人（15才以上）、1回1錠、1日1回食後に服用してください。

なお、毎回同じ時間帯に服用してください。

15才未満、服用しないこと

### 注意

- ・定められた用法・用量を厳守してください。
- ・花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- ・1週間位服用しても症状の改善がみられない場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 錠剤の取り出し方

- ・錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。  
（誤ってシートのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

## 成分

1錠中

ロラタジン 10mg

### 添加物

乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸 Mg

## 使用上の注意

### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
15才未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）、エリスロマイシン、シメチジン
- 服用前後は飲酒しないでください
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
医師の治療を受けている人。  
次の診断を受けた人。  
肝臓病、腎臓病、てんかん  
アレルギー性鼻炎か、かぜなど他の原因によるものかわからない人。  
気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎などの他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。  
妊婦又は妊娠していると思われる人。  
高齢者。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
皮膚：発疹、かゆみ、じんましん、皮膚が赤くなる、脱毛

呼吸器：のどの痛み、鼻の乾燥感

消化器：吐き気、嘔吐、腹痛、口唇の乾燥、口内炎、胃炎

精神神経系：倦怠感、めまい、頭痛

循環器：動悸、頻脈

その他：眼球的乾燥、耳なり、難聴、ほてり、浮腫（顔・手足）、味覚異常、月経不順、胸部不快感、不正子宮出血、胸痛、尿閉  
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

てんかん：（てんかん発作既往歴のある人）

筋肉の突っ張りや震え、意識障害、発作前の記憶がない。

けいれん：筋肉の発作的な収縮があらわれる。

肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、下痢、眠気

### 保管及び取扱い上の注意

- ・ 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ・ 小児の手の届かない所に保管してください。
- ・ 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- ・ 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

23

#### 【多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・ 本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・ 多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・ 多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・ 多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。