

ClaritinEX

- ◆클라리틴 EX(ClaritinEX)는 제 2 세대 항히스타민 성분인 로라타딘을 함유하는 알레르기 전용 비염약입니다.
- ◆졸리지 않아, '집중력, 판단력, 작업효율의 저하'를 잘 일으키지 않는 약입니다.
- ◆1 일 1 회 1 정 의 복용으로 콧물,코막힘,재채기 등의 증상에 장시간 효과적입니다.

효능

꽃가루, 집먼지(실내 먼지) 등에 의한 다음과 같은 코 알레르기 증상 완화:
콧물, 코막힘, 재채기

용법 및 용량

성인(15 세 이상), 1 회 1 정, 1 일 1 회 식후에 복용하십시오.

또한, 매회 같은 시간대에 복용하십시오.

15 세 미만, 복용하지 말 것

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 꽃가루 등의 계절성 알레르기에 의한 비염의 증상에 사용하는 경우는 꽃가루 비산기에 들어 증상이 나오기 시작하면 증상의 가벼운 빠른 시기부터 사용하는 것이 효과적입니다.
- 1 주간 정도 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 의사, 약사 또는 등록판매자 상담하십시오. 또한, 증상이 개선되도 2 주간을 넘어 복용하는 경우는 의사, 약사 또는 등록판매자 상담하십시오.

정제 꺼내는 법

- 정제가 들어 있는 시트의 불룩한 부분을 손가락 끝으로 세게 밀어내 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫고, 정제를 꺼내 복용하십시오.
(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 꽃히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)

성분

In 1 tablets

Loratadine 10mg

첨가물

Lactose, Corn starch, Magnesium stearate

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용·사고가 일어나기 쉽다)

- 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
15 세 미만의 소아.

- 본제를 복용하는 동안은 다음의 어떤 의약품도 사용하지 마십시오.

다른 알레르기용 약(피부질환용 약, 비염용 내복약을 포함), Antihistamine 을 함유하는 내복약 등(감기약, 진해 거담제, 멀미약, 최면진정제 등), Erythromycin, Cimetidine

- 복용 전후는 음주하지 마십시오.

- 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 않거나 본제를 복용할 경우에는 수유를 피하십시오.

상담할 내용

- 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사의 치료를 받고 있는 사람.

다음의 진단을 받은 사람.

간장병, 신장병, 간질

알레르기성 비염에 따른 것인지, 감기 등 다른 원인에 따른 것인지 알 수 없는 사람.

기관지 천식, 아토피성 피부염 등의 다른 알레르기 질환 진단을 받은 적이 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

고령자.

약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

- 복용 후 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

피부: 발진, 가려움증, 두드러기, 피부가 빨개지다, 탈모

호흡기: 인후통, 코의 건조함

소화기: 메스꺼움, 구토, 복통, 입술 건조, 구내염, 위염

정신신경계: 권태감, 현기증, 두통

순환기: 두근거림, 빈맥

기타: 안구 건조, 이명, 난청, 홍조, 부종(얼굴·손발), 미각 이상, 생리 불순, 흉부 불편감, 부정 자궁출혈, 흉통, 소변 정체
드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

쇼크(아나필락시스): 복용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉰소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

간질: (간질 발작 기왕력이 있는 사람)

근육 경축 및 떨림, 의식 장애, 발작 전의 기억이 없다.

경련: 근육의 발작적인 수축이 나타난다.

간 기능 장애: 발열, 가려움증, 발진, 황달 (피부와 눈 흰자위가 노랗게 되는 증상), 갈색뇨, 전신의 나른함, 식욕 부진 등이 나타난다.

- 복용 후 다음 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상의 지속 또는 증강을 보인 경우에는 복용을 중단한 후, 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

입마름, 변비, 설사, 졸음

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

23

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.