

Claritin EX

- ◆Claritin EX 是含有第 2 代抗組織胺成分氯雷他定的過敏專用鼻炎藥。
- ◆此藥劑不易引起睡意，不太會引起"集中力、判斷力、工作效率低下"的問題。
- ◆只需 1 天 1 次服用 1 錠，就能對鼻水、鼻塞、打噴嚏等症狀持續發揮功效。

療效

舒緩由花粉、室內塵埃（室內灰塵）等引起的下列鼻部過敏症狀：
流鼻水、鼻塞、打噴嚏

用法及用量

成人（15 歲以上）每天 1 次，每次 1 錠，請於飯後服用。

同時，每次請於同樣時段服用。

未滿 15 歲者，請勿服用

注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 為舒緩因花粉等季節性過敏所引發的鼻炎症狀時，請於進入花粉飛散期，症狀甫出現而較為輕微時使用，效果更佳。
- 服用 1 週左右症狀仍未見改善時，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。此外，即使症狀改善但服用期間超過 2 週時，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

錠劑取出方法

- 以指尖用力按壓錠劑包裝凸出部位，使鋁箔背膜破裂後取出錠劑服用。
(不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生)

成分

1 片中

Loratadine 10mg

添加劑

Lactose, Corn starch, Magnesium stearate

使用上的注意事項

禁止事項

(若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外)

- 符合下列情形者請勿服用
曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
未滿 15 歲的兒童。
- 服用本藥劑期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。
其他抗過敏藥物（包括皮膚疾病用藥、口服鼻炎藥）、含有抗組織胺藥的口服藥物等（感冒藥、鎮咳祛痰藥、暈車藥、催眠鎮靜藥等）、erythromycin、cimetidine
- 服用前後請勿飲酒
- 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
接受過下列診斷的人。
肝臟病、腎臟病、癩癬
不知是因過敏性鼻炎或是因感冒等其他原因出現症狀者。
被診斷為支氣管哮喘、異位性皮膚炎等其他過敏性疾病者。
孕婦或可能懷孕的人。
老年人。
曾因藥物等引發過敏症狀者。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：出疹、搔癢、蕁麻疹、皮膚發紅、脫毛
呼吸器官：喉嚨疼痛、鼻腔乾燥
消化器官：噁心、嘔吐、腹痛、口乾舌燥、口腔炎、胃炎

精神神經系統：倦怠感、暈眩、頭痛

循環器官：心悸、頻脈

其他：眼球乾燥、耳鳴、聽力衰退、發燙、浮腫（臉部、四肢）、味覺異常、月經不順、胸部不適、子宮不正常出血、胸疼、尿閉
極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立即接受醫師診治。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚搔癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

癲癇：（曾有癲癇病史者）

肌肉僵硬、顫抖、意識障礙、發作前的記憶消失。

痙攣：出現鎮發性的肌肉收縮。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者
口乾、便秘、腹瀉、嗜睡

保管及使用上的注意事項

- 請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。
- 請置於兒童無法觸及之處保管。
- 請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- 請勿服用超過使用期限的產品。

23

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。