

# Claritin EX OD Tablets

- Claritin EX OD 片是一种含有第二代抗组胺成分氯雷他定，无需用水送服，可直接咀嚼服用的速溶型过敏专用鼻炎药。
- 是一种不容易产生嗜睡，不太会引起“集中力、判断力及工作效率下降”的药物。
- 每天服用 1 片，对于流鼻涕、鼻塞和打喷嚏的症状能持续发挥效果。

## 效能

缓解由花粉、室内尘埃（室内灰尘）等引起的下述鼻部的过敏症状：  
鼻涕、鼻塞、打喷嚏

## 用法及用量

成年人(15 岁以上)、按 1 次 1 片、1 天 1 次在饭后以口中溶解服用。  
且，每次在相同时间段服用。

未满 15 岁、不宜服用

### 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 用于因花粉等季节性过敏引起的鼻炎症状时，进入花粉飞散期开始出现症状后，在症状较轻的早期阶段开始使用会比较有效。
- 如果服用 1 周左右仍不见症状改善时，请咨询医师、药剂师或登录贩卖者。此外，即使症状改善服用时间超过 2 周时，请咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

### 药片的取用方法

- 服用时将装有药片的铝箔包装板的盖口部朝上，用手指夹住其撕口（蓝色部分）慢慢撕下后，从下往上推出药片取用。  
（以板装包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）
- 从铝箔包装板中取出药片时请注意不要弄碎。
- 请不要用湿手等直接触摸。（此药片遇水很容易溶化）
- 因为在口腔内部迅速溶解，可以仅用唾液（无水）服用，但是躺下的状态下请不要无水服用。

## 成分

1 片中

Loratadine 10mg

### 添加剂

citric acid, Gelatin, D-Mannitol, flavor, l-Menthol, Vanillin, Propylene glycol

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群请不要服用。  
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群  
未满 15 岁的儿童
- 在服用本药剂期间，不要服用下述任何药物。  
其他抗过敏药（含皮肤疾病用药、鼻炎用内服药）、含抗组胺药物的内服药等（感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、催眠镇静药等）、  
erythromycin、cimetidine
- 请不要在服用前后饮酒。
- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师治疗的人群  
接受以下诊断的人群  
肝脏病、肾脏病、癫痫  
过敏性鼻炎或感冒等不清楚是否因为其他原因引起症状的人群。  
接受过支气管哮喘、特应性皮炎等其他过敏疾病诊断的人群。  
孕妇或有其可能性的人群  
老年人。  
因药物等引起过过敏症状的人群。
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：起疹、发痒、荨麻疹、皮肤发红、脱毛

呼吸系统：咽喉疼痛、鼻子干燥感

消化系统：恶心、呕吐、腹痛、嘴唇干燥、口腔溃疡、胃炎

精神神经系统：倦怠感、头晕、头痛

循环系统：心悸、心动过速

其他：眼球干燥、耳鸣、听力衰退、发烫、浮肿（脸、四肢）、味觉异常、月经不调、胸部不适感、异常子宫出血、胸痛、尿闭  
偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

癫痫：（有癫痫发作病史的人群）

肌肉的痉挛或发抖、意识障碍、无发作之前的记忆。

痉挛：肌肉发生发作性的收缩。

肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，咨询医师、药剂师或登录贩卖者

口腔干燥、便秘、腹泻、嗜睡

## 保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿服用超过使用期限的产品。

13

### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。