

60g

開封口

第2類
医薬品

皮膚用薬

クリニラボ ヘパリオローション

3つの有効成分が、乾燥により
荒れた肌組織を修復し治しますヘパリン
類似物質アラントイン
皮膚修復作用

+

保湿作用

抗炎症作用

抗炎症作用

トコフェロール酢酸エステル

+

血行促進作用

血行促進作用

こんな時におすすめ

お風呂
あがりの
乾燥対策に粉ふき・
ガサガサの
手足に赤ちゃんの
保湿にも

用法・用量

1日1~数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼ等にのぼして貼ってください。

(注意) (1)定められた用法・用量を守ってください。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなる場合があります。)※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

お客様119番室 ☎03-3985-1800

※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元 大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂 1169-142

使いやすい
ワンタッチキャップ

効能

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ(ただれを除く)、さす・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

成分 (100g中)

ヘパリン類似物質……………0.3g
アラントイン……………0.2g
トコフェロール酢酸エステル……0.5g

添加物：プロピレングリコール、dl-βヒロリドンカルボン酸Na、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンベニルエーテル、パラベン、エドト酸Na、BHT、pH調節剤、ヒアルロン酸Na

使用前に、箱に記載の説明文を必ず読んでください。必要な時に読めるよう、この箱を保管してください。

ヘパリン

類似物質 0.3%

+ 皮膚修復
+ 血行促進

成分配合



CLINILABO

ヘパリオ

ローション

HEPARIO LOTION

乾燥により荒れた肌を
修復し治す

さっぱり・よくのびるローション

〈無香料〉

第2類
医薬品

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
(1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。(2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人。(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります) 2. 次の部位には使用しないでください 目、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。2. 使用后、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 本剤のついた手で、目などの粘膜に触れないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931