

使用前请务必阅读本说明书。  
请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

适用于不愿被看到的因手部湿疹等原因而留下挠痒伤疤之前



CLINILABO

# MEDIROID PVA CREAM

2类药品

商品名: CLINILABO MEDIROID PVA CREAM (湿疹、皮炎治疗药物)

- ◆ CLINILABO MEDIROID PVA CREAM 含有中级类固醇成分，对不愿被看到的手部湿疹有效。
- ◆ 含有对患处有效，在体内活性降低的前药类固醇-泼尼松龙醋酸戊酸酯等4种活性成分可抑制顽固湿疹及皮炎。
- ◆ 药膏不黏稠、干爽，适用于手部湿疹等情况。



## 使用注意事项

### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易发生不良反应)

- 1 请勿用于下述部位
  - (1) 水痘、脚癣/顽癣等或化脓的患处。
  - (2) 眼睛周围、黏膜等。
- 2 请勿大面积用于面部
- 3 请勿长期连续使用



### 咨询事项

- 1 下述人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册销售商
  - (1) 正在接受医生治疗者。
  - (2) 孕妇或可能怀孕的人。
  - (3) 曾因药物等发生过敏症状者。
  - (4) 患处面积较大者。
  - (5) 湿润或溃烂严重者。
- 2 使用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商



相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、瘙痒、斑疹、干燥感、刺激感、热感、灼热感
皮肤(患处)	脚癣/顽癣等白癣、粉刺、化脓症状、持续的刺激感

- 3 如果使用5~6天左右症状仍未改善，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

## 功效

湿疹、皮炎、痱子、斑疹、瘙痒、昆虫叮咬、荨麻疹

# 用法用量

请每天取适量多次涂抹在患处。


## [注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时,请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 请小心不要让药物进入眼睛。万一进入眼睛,请立即用水或温水清洗。如果症状严重,请到眼科医生处就诊。
- (4) 仅限外用。
- (5) 请勿用保鲜膜等透气性差的物品覆盖使用部位。

## (铝管的使用)

- 请从软管折叠(尾)部分朝着前端的顺序挤出。 ●软管破裂,药剂可能会飞溅出来。

(①→②)



请勿折弯。



请勿折叠。



# 成分

1g 中含

成分	含量	作用
泼尼松龙醋酸戊酸酯	1.5mg	从源头消除炎症,抑制湿疹、瘙痒、皮炎。
克罗米通	50mg	快速止痒。
生育酚乙酸酯	5mg	促进血液循环,帮助修复患处。
异丙基甲基酚	1mg	对患处进行杀菌,预防细菌感染。

辅料:聚山梨酯60、聚氧乙烯氢化蓖麻油、丙二醇、对羟基苯甲酸酯、硬脂醇、鲸蜡醇、聚羧乙烯、癸二酸二乙酯、三乙醇胺

# 储存及操作注意事项

- (1) 请在避免阳光直射的阴凉处密封保存。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。(否则会导致误用或变质)
- (4) 请勿使用超过使用期限的产品。此外,即使在使用期限内,开封后也请尽早使用。(为保证质量)



## 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的,基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译,仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商(或本公司)的暂时翻译,今后有可能被修改或变更,恕不另行通知。
- 供应商(或本公司)对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。