

使用前請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以備不時之需。

用於不想讓人看到的手部濕疹等 在抓破形成疤痕前



MEDIROID PVA CREAM

第二類醫藥品

銷售名稱：CLINILABO MEDIROID PVA CREAM〈濕疹、皮膚炎治療藥物〉

- ◆ CLINILABO MEDIROID PVA CREAM 為治療不想讓人看到的手部濕疹等，含中效類固醇成分配方之藥品。
- ◆ 含有僅在患部發揮作用，並在體內低活性化之安樂類固醇 Prednisolone valerate acetate 等 4 種有效成分，緩解惱人濕疹及皮膚炎。
- ◆ 為清爽不黏膩、容易滲入手部濕疹等的乳膏。



使用上的注意事項



禁止事項

(若不遵守，可能導致目前的症狀惡化，或者容易引發副作用)

- 1 請勿用於下列部位
 - (1) 水痘、足癬、頑癬等或已化膿的患部。
 - (2) 眼睛周圍、黏膜等。
- 2 請勿廣範圍使用於臉部
- 3 請勿長期連續使用



諮詢事項

- 1 下列人士使用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 孕婦或可能懷孕者。
 - (3) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
 - (4) 患部為廣範圍者。
 - (5) 浸潤或潰爛嚴重者。
- 2 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者



相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、搔癢、斑疹、乾燥感、刺激感、灼熱感、刺痛感
皮膚(患部)	足癬及頑癬等的白癬、面疱、化膿症狀、持續刺激感

- 3 若使用 5~6 天左右症狀卻未見改善，請停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

療效

濕疹、皮膚炎、汗疹、斑疹、發癢、蚊蟲叮咬、蕁麻疹

用法及用量

1 天數次適量塗抹於患部。

【注意】


- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 請注意避免誤入眼內。如不慎入眼，請立即以冷開水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。
- (4) 僅供外用。
- (5) 請勿使用保鮮膜等透氣性不良物品包覆使用部位。

〈鋁質軟管的使用方式〉

- 請從軟管的折疊處（尾端）朝前端依序擠出。

- 可能導致軟管破損而使藥劑噴出。

(①→②)



請勿彎折。



請勿折疊。



成分

1g 中

成分	分量	效用
Prednisolone valerate acetate	1.5mg	從源頭緩解發炎，抑制濕疹、發癢、皮膚炎。
丁烯醯苯胺	50mg	快速緩解搔癢。
生育酚醋酸酯	5mg	促進血液循環，幫助患部修復。
異丙基甲基酚	1mg	針對患部進行殺菌，防止細菌感染。

添加物：聚山梨醇酯60、聚氧乙烯氫化蓖麻油、丙二醇、對羥基苯甲酸酯、硬脂醇、鯨蠟醇、卡波姆、癸二酸二乙酯、三乙醇胺

保管及使用上的注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- (4) 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早使用完畢。（這是為了確保品質）



【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。