

使用前请务必阅读本说明书。  
请妥善保管，以便在需要时能随时阅读。

适用于不愿被看到的因前胸湿疹等原因而挠破留疤之前



CLINILABO

# MEDIROID VS 软膏

2类药品

商品名: CLINILABO MEDIROID VS软膏

〈湿疹、皮炎治疗药物〉

- ◆ CLINILABO MEDIROID VS软膏含有强力类固醇成分，对不愿被看到的前胸湿疹有效。
- ◆ 转换OTC成分倍他米松戊酸酯可抑制顽固湿疹及皮炎。
- ◆ 紧贴软膏贴合保护前胸等易摩擦的患处。



## 使用注意事项



### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易发生不良反应)

- 1 下述人群请勿使用  
因本品或本品的成分引起过敏症状的人。
- 2 请勿用于下述部位  
(1) 水痘、脚癣/顽癣等或化脓的患处。  
(2) 眼睛周围、黏膜等。
- 3 请勿大面积用于面部
- 4 请勿长期连续使用



### 咨询事项



- 1 下述人群请在使用前咨询医生、药剂师或注册销售商  
相談してください  
(1) 正在接受医生治疗者。  
(2) 孕妇或可能怀孕的人。  
(3) 曾因药物等发生过敏症状者。  
(4) 患处面积较大者。  
(5) 湿润或溃烂严重者。
- 2 使用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止使用，  
并携带本说明书咨询医生、药剂师或注册销售商

| 相关部位   | 症状                         |
|--------|----------------------------|
| 皮肤     | 皮疹/发红、瘙痒                   |
| 皮肤(患处) | 脚癣/顽癣等白癣、粉刺、化脓症状、持续性刺激感、变白 |

- 3 如果使用5~6天左右症状仍未改善，请停止使用，并携带本说明书  
咨询医生、药剂师或注册销售商

## 功效


湿疹、皮炎、痱子、斑疹、瘙痒、冻疮、昆虫叮咬、荨麻疹

## 用法用量

请取适量涂抹在患处，每天1次~多次。

### [注意事项]

- (1) 请严格遵守规定的用法用量。
- (2) 儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。
- (3) 请小心不要让药物进入眼睛。万一进入眼睛，请立即用水或温水清洗。如果症状严重，请到眼科医生处就诊。
- (4) 仅限外用。
- (5) 请勿用保鲜膜等透气性差的物品覆盖使用部位。另外，在接触尿布的部位使用时，请勿使用紧贴的尿布或塑料等具有密封性的内裤。
- (6) 化妆、剃须后请勿使用。



### 〈软管开孔方法〉

请将盖子倒置，用力将突起部按压到软管前端。

## 成分

1g中

| 成分      | 含量    | 作用                  |
|---------|-------|---------------------|
| 倍他米松戊酸酯 | 1.2mg | 从源头消除炎症，抑制湿疹、瘙痒、皮炎。 |

辅料：液体石蜡、凡士林

## 储存及操作注意事项

- (1) 请在避免阳光直射的阴凉处密封保存。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请勿更换其他容器。(否则会导致误用或变质)
- (4) 请勿使用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后也请尽早使用。(为保证质量)



### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。