

◆COLAC是对于慢性便秘以及习惯性便秘效果显著的便秘药。通过bisacodyl直接刺激大肠使大肠蠕动活跃，从而促进通便。

效能或效果

慢性便秘、习惯性便秘

用法及用量

通常 大人1天1次2片，在入睡前或排便期待数时间前，请吞服并配合水或温开水服用。

请严格遵守规定的用法用量。

请尽量空腹时服用。

请勿在喝下抗酸剂或牛奶后的1小时以内服用。（本药剂会因抗酸剂或牛奶在胃中溶解，有可能不能发挥预期的药效）

抗酸剂：多数胃药中含有的成分，具有中和胃酸的作用。

不要咀嚼或弄碎药片，请直接服用。（本药剂做了特殊涂层，以使其中的有效成分充分发挥能力并在大肠内发挥作用）

药片的取用方法

•如图所示用指尖用力按下装有药片的PTP板的凸出部，弄破背面的铝箔再取出服用。

（以板装包装的状态直接误吞，会发生穿破食管粘膜等意外事故）

成分及分量

2片中

Bisacodyl 10mg

添加剂

Sugar,Talc,Acacia ,Castor oil ,Methacrylic acid copolymer S,Methacrylic acid copolymer L,Corn starch ,Magnesium stearate,Glycerin,Titanium oxide,Lactose ,Erythrosine,Carnauba wax ,White beeswax,Macrogol

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

●在服用本药剂期间，不要服用下述医药品

其他泻下药（泻药）

●不要大量服用

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

拥有以下症状的人群

带有剧烈腹痛或恶心、呕吐人群。

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

消化系统：

剧烈腹痛

恶心

呕吐

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

●若服用1周左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任