

◆大正汉方便秘药是改善便秘以及便秘引起的肌肤粗糙等症状的汉方处方“大黄甘草汤”便秘药。■在入睡前服用，翌日早上可以实现接近自然的通便。●本药剂是带有切割线的小颗粒易服用的药片。

效能或效果

缓解便秘、便秘伴随的头重、上火、湿疹、皮肤炎、小疙瘩（粉刺）、食欲不振（食欲减退）、腹部胀满、肠内发酵异常、痔疮等症状与体力情况无关，均可使用。

用法及用量

在入睡前，请按以下用量吞服并配合水或温开水服用。但是，初次时用最少量，根据大便通畅的情况，一次半片乃至1片地增量（不超过下记的最大量）或减量。

成年人（15岁以上），2~3天大便不通畅时：1次1~3片，1天1次

成年人（15岁以上），4天以上大便不通时：1次2~4片，1天1次

儿童（5~14岁）2~3天大便不通时：半片~1片半，1天1次

儿童（5~14岁）4天以上大便不通时：1次1片~2片，1天1次

未满5岁，不宜使用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

月经期的妇女，请减少用量

请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

成分及分量

4錠中

Powdered Diokanzoto Extract 400mg〔The Dry Extract extracted from 1600 mg of Rhubarb and 400 mg of Glycyrrhiza〕

添加剂

Magnesium aluminometasilicate ,anhydrous silicic acid ,Potato starch,Carboxymethylcellulose calcium ,Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,hardened oil

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

●在服用本药剂期间，不要服用下述医药品

其他泻下药（泻药）

●处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

孕妇或有其可能性的人群

身体虚弱人群（体力不足、身体虚弱的人群）。

肠胃虚弱，容易腹泻的人群。

因药物等出现过过敏症状的人群

带有剧烈腹痛或恶心、呕吐人群。

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

消化系统：

伴随剧烈腹痛的腹泻

恶心

呕吐

腹痛

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

●若服用5~6天后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任