

大正漢方便秘薬

◆大正漢方便秘薬は、便秘や便秘に伴う肌あれ等の症状を改善する漢方処方「大黃甘草湯」の便秘薬です。●就寝前に服用していただく、翌朝自然に近いお通じが得られます。■割線の入った、小粒で服用しやすい錠剤です。

効能・効果

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常発酵・痔などの症状の緩和
体力に関わらず、使用できます。

用法・用量

次の量を就寝前にかまわずに水又はぬるま湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら、半錠ないし1錠ずつ増量（下記の最大量まで）又は減量してください。

成人（15歳以上）2～3日便通がない時：1回1錠～3錠、1日1回

成人（15歳以上）4日以上便通がない時：1回2錠～4錠、1日1回

小児（5～14歳）2～3日便通がない時：半錠～1錠半、1日1回

小児（5～14歳）4日以上便通がない時：1回1錠～2錠、1日1回

5歳未満、服用しないこと

定められた用法・用量を厳守してください。

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

月経時の婦人は服用量を減らしてください

ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。（変色等の原因となり、品質が変わることがあります）

成分及び分量

4錠中
大黃甘草湯エキス末(2/5量) 400mg（ダイオウ1600mg、カンゾウ400mgの抽出乾燥エキス末）

添加物

メタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、バレイシヨデンブ、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、硬化油

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

●本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の瀉下薬（下剤）

●授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

●次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

胃腸が弱く下痢しやすい人。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人。

●服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

消化器：

はげしい腹痛を伴う下痢

吐き気

嘔吐

腹痛

●服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

●5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しい所に（密栓して）保管すること。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。