

◆大正漢方便秘藥為改善便秘及伴隨便秘而來的皮膚粗糙等症狀，以漢方配方「大黃甘草湯」所研製而成的便秘藥。●就寢前服用，隔日早晨即可近乎自然地排便。●設有分割線，易於服用的小粒錠劑。

療效或效果

舒緩便秘、伴隨便秘而出現的頭重、上火、濕疹、皮膚炎、粉刺（面皰）、食慾不振（食慾減少）、腹部膨脹、腸內異常發酵、痔瘡等症狀不需考慮體力狀況亦可使用。

用法及用量

請於睡前將以下用量不咬碎用冷水或微溫水吞服。不過，請於首次使用最少用量，然後視排便情況或狀態，再逐漸半片乃至1片的增量(直至下列的最多用量為止) 或減量。

成人（15歲以上）2～3天不能排便時：1次1片～3片，1天1次

成人（15歲以上）4天以上不能排便時：1次2片～4片，1天1次

兒童(5～14歲) 2～3天沒有排便時：半片～1片半，1天1次

兒童(5～14歲) 4天以上沒有排便時：1次1片～2片，1天1次

未滿5歲者，請勿使用

請務必遵守規定用法、用量。

兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。

生理期的女性請減量服用

請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

成分及分量

4片中
Powdered Diokanzoto Extract 400mg〔The Dry Extract extracted from 1600 mg of Rhubarb and 400 mg of Glycyrrhiza〕

添加劑

Magnesium aluminometasilicate ,anhydrous silicic acid ,Potato starch,Carboxymethylcellulose calcium ,Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,hardened oil

使用上的注意事項

禁止事項

- （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品。
其他瀉下藥（瀉藥）
 - 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳

諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
正在接受醫師治療的人。
孕婦或可能懷孕的人。
身體虛弱的人（體力衰弱的人、體弱的人）。
胃腸弱，容易腹瀉的人。
曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
有劇烈腹痛或噁心・嘔吐的人。
- 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚：
發疹、發紅
發癢
消化器官：
伴隨劇烈腹痛的腹瀉
噁心
嘔吐
腹痛
- 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 即使用5～6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。
請置於兒童無法觸及之處保管。
請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內服用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。