

# TAISHO KAMPO LAXATIVES

- ◆TAISHO KAMPO LAXATIVES 是改善便秘以及便秘引起的小疙瘩、皮肤炎、腹部凸起(腹部胀满)症状的汉方处方“大黄甘草汤”便秘药。
- ◆在入睡前服用，翌日早上可以实现接近自然的排便。
- ◆本药剂是带有切割线的小颗粒易服用的药片。

## 效能

缓解便秘、便秘伴随的头重、上火、湿疹、皮肤炎、小疙瘩（粉刺）、食欲不振（食欲减退）、腹部胀满、肠内发酵异常、痔疮等症状

## 注意

与体力情况无关，均可使用。

## 用法及用量

在入睡前，请按以下用量吞服并配合水或温开水服用。

但是，初次时用最小量，根据大便通畅的情况，一次半片乃至1片地增量（不超过下记的最大量）或减量。

成年人（15岁以上），2~3天大便不通时：1次1~3片，1天1次

成年人（15岁以上），4天以上大便不通时：1次2~4片，1天1次

儿童（5~14岁）2~3天大便不通时：1次半片~1片半，1天1次

儿童（5~14岁）4天以上大便不通时：1次1~2片，1天1次

未满5岁，不宜服用

## 注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 月经期的妇女，请减少用量。
- 请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

## 成分

4片中

大黄甘草汤精华粉（2/5量） 400mg

（大黄 1600mg，甘草 400mg）

## 添加剂

硅酸铝镁，二氧化硅，马铃薯淀粉，羧甲基纤维素钙，羟丙基纤维素，硬脂酸镁，硬化油

## 注意

- 服用本药剂，可能会出现尿液变橙色或红色的情况，这是因本药剂中的大黄所引起的现象，因此不用担心。
- 本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变。

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

- 在服用本药剂期间，不要服用下述医药品  
其他泻下药（泻药）
- 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳

### 咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师治疗的人群。  
孕妇或有其可能性的人群。  
身体虚弱人群（体力不足、身体虚弱的人群）。  
肠胃虚弱，容易腹泻的人群。  
因药物等出现过过敏症状的人群。  
拥有以下症状的人群。  
剧烈腹痛，恶心、呕吐
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：起疹、发红，发痒  
消化系统：伴随剧烈腹痛的腹泻，恶心、呕吐，腹痛

- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
腹泻
- 若服用 5~6 天左右后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

### 保管及使用注意事项

- 保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在 6 个月以内服用。(为了保证质量)

21

#### 【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。