

# COLAC SUPPOSITORY TYPE

第三类医药品  
便秘药

◆COLAC栓剂的微小球状的碳酸气会直接作用于直肠，促进大便通畅。●使用后，大约10~30分钟后出现效果。■12岁以上可以使用。

## 效能或效果

便秘

## 用法及用量

12岁以上，请按1次1粒插入直肠内，若未见效果，再插入1粒。未满12岁请勿使用。〔本药剂是从肛门插入的药。请勿经口服用。〕

请严格遵守规定的用法用量。

本药剂使用后，请忍耐一段时间直到便意变强。

（如果使用后立即尝试排便的话，可能仅排出药剂，导致无法发挥药效）

12岁以上的儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。

本药剂过软时，请冷却一段时间后使用。

此外，如果过硬，请置于室温一段时间，变软后使用。

本药剂仅限用于肛门。

## 成分及分量

1粒（2.6g）中

Sodium bicarbonate 0.5g

Sodium Dihydrogen Phosphate 0.68 g 0.68g

## 添加剂

anhydrous silicic acid ,Soya lecithin,Hard fat

## 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用）

●下述人群不要使用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

●在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品

其他便秘药（泻药,灌肠药）

●避免连续使用（若经常使用则会使其效果减弱（产生所谓的“习惯”），并容易依赖药剂。）

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

拥有以下症状的人群

带有剧烈腹痛或恶心、呕吐人群。

使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

消化系统：

腹泻

残便感

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克：服用后马上出现胸闷等症状的同时，出现脸色发白、手脚发冷、冷汗、气闷等症状

●若使用2~3次后仍无排便则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

使用后有可能会出现下述症状

肛门部刺激感

腹部不适

腹痛

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射、潮气小的30℃以下的阴凉场所

但是，铝袋包装开封后的未使用部分，请放在避免阳光直射的潮气小的阴凉处（15℃以下）进行保管。

请保管在儿童无法触及的地方。

保管时，请将栓剂的前端向下放回铝袋，放进外箱中，并沿着外箱的标记立着保管

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任