DELITREANA

第二類醫藥品 鎮痛、鎮癢、收斂、消炎藥(包 含泥敷劑)

◆DELITREANA為治療私密部位搔癢的藥膏。●6種有效成分迅速緩解搔癢,改善起斑疹的肌膚。●舒爽清涼感,清爽不黏膩,延展力佳的非類固醇類乳 膏。

療效或效果

濕疹、皮膚炎、潰爛、汗疹、斑疹、發癢、凍瘡、蟲咬、蕁麻疹

用法及用量

請1天數次,適量地塗抹於患處。

請務必遵守規定用法、用量。

兒童使用時,請於家長的指導監督下使用。

請注意避免誤入眼內。如不慎入眼,請立即以冷開水或溫水沖洗,如症狀嚴重時,請接受眼科醫師的診治。 僅供外用。

成分及分量

100g中

Diphenhydramine 1.0g

Lidocaine 2.0g

Glycyrrhetinic Acid 1.0a

Tocopherol Acetate (Vitamin E) 0.5a

Isopropylmethylphenol 0.1a

I-Menthol 0.5g

添加劑

Polysorbate 60 ,Polyoxyethylene hydrogenated castor oil 60,Octyldodecyl myristate,Isooctadecanoic acid,Stearyl alcohol, Medium-chain fatty acid triglyceride, 1,3-Butylene glycol, Carboxyvinyl polymer, Edetate sodium, Butyl

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於使用前,請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等, 引發過敏症狀的人。

浸潤和潰爛嚴重的人。

●使用後,出現下列症狀的情況下,有可能是副作用,請立刻停止使用,攜帶此文件,詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者 皮膚:

發疹、發紅

發癢

●即使使用5~6天,症狀也沒有改善的情況下,請停止使用,攜帶此文件,詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到(濕氣少)的陰涼處(蓋緊)。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。(可能造成誤用或產品變質)

請勿使用超過使用期限的產品。此外,即使於使用期限內,產品一經開封,請儘早使用完畢。(為確保品質)

22

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责事项】

- •本产品以作为在日本国内销售及使用为目的,基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的 医药品。
- •多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译,仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的 法律规定。
- ·多国语言产品信息是由提供者(或本公司)的暂时翻译,将来可能会被修改或变更,恕不另行通知。
- ·关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题,提供者(或本公司)不负任何法律责任。

26-Jul-2019 1/1 page