

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

歯ぐきのハレ・出血を伴う歯槽膿漏(歯周炎)・歯肉炎を予防する


(薬用歯みがき)

歯周・口腔用 デントウェル

販売名: デントウェル薬用VC-4

◆歯周病は、歯そのものの病気ではなく、歯を支えている周りの組織(歯ぐき、歯槽骨など)がおかされる病気で、一般的には歯槽膿漏や歯肉炎と呼ばれています。自覚症状がないため、自分では気付かないうちに症状が進み最後には歯がぬけ落ちてしまいます。歯ぐきがハレる、出血する、口臭が気になる、歯ぐきが退縮して水などで歯がしみるなどの症状があらわれたら注意してください。

健康な歯ぐき



歯ぐきは、きれいなピンク色をしています。コラーゲン線維が密に存在し、弾力性があります。

歯周病になった歯ぐき



歯ぐきはぶよぶよに赤くハレています。コラーゲン線維が壊れていて、出血しやすくなります。

成人では80%以上が歯周病といわれています。歯周病の予防には毎日のブラッシングが大切です。健康な歯ぐきのためにデントウェルシリーズでのブラッシングをおすすめします。


*歯周病とは、歯肉炎・歯周炎の総称です。

特長

- 壊れやすいビタミンCを特殊な基剤で包み込むことにより、安定配合しました。(特許 第5026056号)
- ビタミンC、3つの殺菌成分(CPC、IPMP、トリクロサン)、2つの抗炎症成分(β-GR、アラントイン)が、歯肉炎・歯周炎を予防し、フッ素がむし歯を防ぎ、ゼオライトが歯石の沈着を防ぎます。
- 清掃剤スクラブシリカ(無水ケイ酸)が歯の表面を傷つけることなく、歯の表面やすき間の汚れを落として、歯をツルツルにします。
- 引き締め感のあるメディカルハーブの香味です。(香味成分チョウジ油配合)

ビタミンCについて

ビタミンCは歯ぐきの健康に大切な成分です。壊れたコラーゲン線維の再生を促進することで、歯肉炎を予防します。



効能

歯周炎(歯槽膿漏)の予防。歯肉(齦)炎の予防。歯石の沈着を防ぐ。むし歯の発生及び進行の予防。口臭の防止。歯を白くする。口中を浄化する。口中を爽快にする。

成分

薬用成分

はたらき

L-アスコルビン酸(ビタミンC) ハレを抑えて、歯肉炎・口臭を防ぎます。

2つの抗炎症成分
・β-グリチルレチン酸(β-GR)
・アラントイン 炎症やハレを抑え、歯槽膿漏・歯肉炎を予防します。

3つの殺菌成分
・塩化セチルピリジニウム(CPC)
・イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
・トリクロサン 細菌の繁殖を抑え、歯肉炎・口臭・むし歯を防ぎます。

モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 歯質を強化し、むし歯の発生及び進行を防ぎます。

ゼオライト 吸着作用により、歯石の沈着を防ぎます。

溶剤: 1,3-ブチレングリコール、無水エタノール／清掃剤: エリスリトール、無水ケイ酸／安定剤: 酸化チタン、酢酸DL-α-トコフェロール／薬用成分: L-アスコルビン酸(ビタミンC)、ゼオライト、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)、アラントイン、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、β-グリチルレチン酸(β-GR)、トリクロサン／粘度調整剤: キサンタンガム、ヒドロキシプロピルセルロース／基剤: ポリエチレングリコール600／pH調整剤: リン酸水素二ナトリウム、無水クエン酸／発泡剤: ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン／清涼剤: l-メントール、ハッカ油／香味剤: 香料(メディカルハーブタイプ)、チョウジ油／着色剤: 黄色203号、赤色213号／甘味剤: サッカリンナトリウム／着色剤: アスコルビン酸ナトリウム

使用方法、使用上の注意については、裏面をご覧ください。

使用方法

適量(約1cm)を歯ブラシにとり、歯及び口腔内を清掃し、歯ぐきをマッサージしてください。

使用上の注意

- 傷などに直接つけないでください。
- 本品の基剤には水が含まれておりませんので、歯ブラシをよく水で濡らしてからご使用ください。また、歯みがき後は水でよく口をすすいでください。
- 口腔内に痛み・出血などの異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

デントウェルシリーズのご紹介

歯ぐきのハレ・
出血を伴う
歯槽膿漏(歯周炎)・
歯肉炎を予防する

歯周・口腔用デントウェル 販売名:デントウェル薬用VC-4



歯周病専門医が
設計した歯ブラシ

歯科用 デントウェル歯ブラシ 超コンパクト ふつう・やわらかめ



歯科用 デントウェル歯ブラシ コンパクト ふつう・やわらかめ




歯と歯ぐきの健康のために

- 食後必ず歯みがきをする習慣を身につけましょう!
 - ・毎食後なるべく3分以内に、3分間以上歯みがきすることが大切です。
 - ・歯と歯の境目や歯と歯ぐきの間は特にていねいにブラッシングしましょう。
- 歯周病対策に効果的なブラッシング法

スクラビング法


歯面に対して直角に歯ブラシの毛先を当て、前後に細かくブラッシング。



歯面の歯垢除去に適しています。

バス法

歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきのすき間に入れるように細かくブラッシング。



歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)の歯垢除去や歯ぐきのマッサージに適しています。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3-24-1

 <http://www.taisho.co.jp/dentwell/>

製造販売元
日本ゼットック株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-2