

脚癣、顽癣是称为白癣菌的真菌寄生在皮肤表面的角质层等中而引起的疾病。白癣菌侵入皮肤表面的角质层等角质，在皮肤表面引起炎症，发生严重的发痒症状。■Dermarin L通过有效成分的作用消灭白癣菌、改善脚癣的不适症状。■1天涂抹1次，可发挥治疗效果。

## 效能或效果

脚癣、股癣、体癣

## 用法及用量

1天1次，请取适量涂抹于患处。  
请严格遵守规定的用法用量。  
请勿在患处或其周围弄脏的状态下使用。  
注意不要入眼。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗，并及时前往眼科就诊。  
儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。  
仅限用于外用。

## 成分及分量

100 g 中  
Miconazole nitrate 1.0g  
Crotamiton 10.0g  
Lidocaine 2.0g  
Dipotassium Glycyrrhizinate 0.5g  
Carbamide 3.0g

## 添加剂

Sorbitan stearate, Polysorbate 60, Self-emulsifying glyceryl stearate, Stearyl alcohol, Cetanol, Propylene glycol, Diisopropyl adipate, Methyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate copolymer, Polyoxyethylene nonylphenyl ether, Butylated hydroxytoluene, Sodium pyrosulf

## 使用注意事项

### 禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用)  
●不要用于下述部位  
眼睛周围、粘膜(例如：口腔、鼻腔、阴道等)、阴囊、外阴部等  
湿疹。  
湿润、糜烂、开裂或外伤严重患处

### 咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
正在接受医师治疗的人群  
婴幼儿  
因药物等出现过过敏症状的人群  
患处位于脸部或范围较大的人群  
患处化脓的人群。  
无法明确是“湿疹”或“脚癣、股癣、体癣”的人群。(阴囊存在发痒或糜烂等症状时，由湿疹等引起的情况较多。)  
●使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者  
皮肤：起疹发红、肿胀、发痒、斑疹、刺激感、落屑、发热、糜烂、水疱、干燥、僵硬感、刺痛感  
●若使用2周后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。  
请保管在儿童无法触及的地方。  
请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)  
请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任