

무좀·백선은 백선균이라는 곰팡이(진균)가 피부표면의 각질층 등에 기생하여 일어나는 질환입니다. 백선균이 피부표면의 각질층 등의 케라틴질을 침범함에 따라 피부표면에 염증을 일으켜 심한 가려움증이 발생합니다. Dermarin L은 유효성분의 작용으로 인해 백선균을 살균하고 무좀의 불쾌한 증상을 개선합니다. 하루 한 번만 도포해도 치료 효과를 발휘합니다.

효능 또는 효과

무좀, 완선, 체부백선

용법 및 용량

1일 1회, 적당량을 환부에 바르십시오.

정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.

환부 및 그 주위가 지저분한 채로 사용하지 마십시오.

눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어갔을 경우에는 바로 물로 행구고 즉시 안과의의 진료를 받을 것.

소아에게 사용하게 할 경우는 보호자의 지도 감독하에 사용하도록 하십시오.

외용에만 사용하십시오.

성분 및 분량

In 100 g

Miconazole nitrate 1.0g

Crotamiton 10.0g

Lidocaine 2.0g

Dipotassium Glycyrrhizinate 0.5g

Carbamide 3.0g

첨가물

Sorbitan stearate, Polysorbate 60, Self-emulsifying glyceryl stearate, Stearyl alcohol, Cetanol, Propylene glycol, Diisopropyl adipate, Methyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate copolymer, Polyoxyethylene nonylphenyl ether, Butylated hydroxytoluene, Sodium pyrosulf

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

● 다음의 부위에는 사용하지 말 것

눈과 눈 주위, 점막(예를 들어, 구강, 비강, 질 등), 음낭, 외음부 등.

습진.

습윤, 진무름, 균열 및 외상이 심한 부위.

상담할 내용

● 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것
의사의 치료를 받고 있는 사람.

영유아.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

환부가 안면 또는 넓은 범위에 해당하는 사람.

환부가 굵은 사람.

'습진'인지 '무좀, 완선, 체부백선'인지 분명치 않은 사람 (음낭 가려움증·진무름 등의 증상이 있다면, 습진 등 다른 원인에 의한 경우가 많다.)

● 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

피부: 발진·발적, 부음, 가려움, 접촉성 피부염, 자극감, 낙설, 열감, 진무름, 수포, 건조·당김, 따끔거림

● 2주 정도 사용해도 증상이 나아지지 않으면 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

보관 및 취급상의 주의

직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 뚜껑을 닫은 채 보관하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)

사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질 유지를 위하여)

【OTC 의약품의 다언어 제품 정보에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다..