

足癬、頑癬為被稱為白癬菌的黴菌（真菌）寄生於皮膚表面角質層等所造成的疾病。白癬菌侵襲皮膚表面角質層等的角蛋白質，造成皮膚表面發炎而產生強烈搔癢。■Dermarin L液成分配方有效作用，針對白癬菌進行殺菌，改善足癬不適症狀。■每天塗抹1次即可發揮療效。

療效或效果

足癬、股癬、體癬

用法及用量

請1天1次，適量地塗抹於患處。

請務必遵守規定用法、用量。

請勿於患部或其周圍髒污的情況下使用。

請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗，立刻接受眼科醫師的診療。

兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

僅供外用。

成分及分量

100mL中

Miconazole nitrate 1.0g

Crotamiton 10.0g

Lidocaine 2.0g

Dipotassium Glycyrrhizinate 0.5g

l-Menthol 1.0g

添加劑

Diisopropyl adipate ,Ethylcellulose ,Macrogol ,BHT,Anhydrous ethanol

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●請勿使用於下列部位

眼睛和眼睛周圍、黏膜（例如：口腔、鼻腔、陰道等）、陰囊、外陰部位等。

濕疹。

浸潤、潰爛、龜裂和外傷嚴重的患部。

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

嬰兒、幼童。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

患部在臉部或廣範圍的人。

患部正在化膿的人。

不確定是「濕疹」或「足癬、股癬、體癬」的人。（陰囊有發癢、潰爛等症狀的情況下，大多是濕疹等原因所造成。）

●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：出疹、發紅、腫脹、搔癢、斑疹、刺激感、脫屑、灼熱感、潰爛、水皰、乾燥、抽筋感、刺痛感

●即使使用2週左右，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請遠離火源。

本藥劑沾附地板、家具等塗層可能造成其變質，因此使用時請注意避免沾附。

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。