

使用前に次の説明文を必ずお読みください。

さわやかさらさら パウダースプレー

# ダマリン

POWDER SPRAY

## DX

ダマリンパウダースプレー DX

第2類医薬品

### 【使用上の注意】

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膈等）、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

### 相談すること



#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)乳幼児。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)患部が顔面又は広範囲の人。

(6)患部が化膿している人。

(7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

\*：全身に発現することもあります

#### 3. 2週間位使用しても症状がよくなり場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

### 【用法・用量】

1日1回、適量を患部に噴射塗布してください

### 【注意】

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(5)外用にのみ使用してください。

(6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

(7)使用前によく振ってください。

(8)患部まで約10cmの距離で噴射してください。なお、噴射口をよく確かめ、顔面、特に目に向けて噴射したり、吸入しないでください。

(9)同じ箇所連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷却力が強いいため、過度の使用により凍傷になる恐れがあるため)

よく振ってお使いください。

## 【成分】 90g 中

テルピナフィン塩酸塩	135mg
リドカイン	270mg
グリチルレチン酸	67.5mg
<i>l</i> -メントール	135mg

添加物：ソルピタンセスキオレイン酸エステル、ミリスチン酸オクチルドデシル、エタノール、炭酸マグネシウム、酸化チタン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、トウモロコシデンブ、LPG、イソペンタン

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
  - (2)小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
  - (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため)
  - (5)火気に近づけないでください。
  - (6)本剤は床、家具等の塗装面に付きますと変質させることがありますので、付着しないよう取扱いに注意してください。
- ★残量が少なくなった時、缶を横にして使用すると、出にくくなる場合があります。

### 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
  - ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
  - ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
  - ④火の中に入れていないこと。
  - ⑤使い切って捨てること。
- 高圧ガス：LPG・イソペンタン

- 捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。  
火気厳禁 原液 15mL (エタノール含有)

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

大正製薬株式会社<sup>21</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

お客様 119 番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

——本文は、直接容器に記載されている事項です——